



**OGÓLNE WARUNKI  
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  
NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU  
NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO  
SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM**

W poniższej tabeli przedstawiamy postanowienia ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, kod warunków TUGP55 (OWU), które regulują zasady wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Poniższe postanowienia są częścią OWU, a ich wskazanie wynika z przepisów prawa (art. 17 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

| Lp. | Rodzaj informacji                                                                                                             | Numer zapisu                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Przesłanki wypłaty świadczenia                                                                                                | pkt 1-2<br>pkt 4-6<br>pkt 10-12<br>pkt 30<br>pkt 31-43<br>pkt 44 |
| 2.  | Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty świadczeń lub ich obniżenia | pkt 1-2<br>pkt 6<br>pkt 7-9<br>pkt 27-28<br>pkt 29<br>pkt 44     |

Informacje o ubezpieczeniu uzyskasz:

 na [pzu.pl](http://pzu.pl)



pod numerem infolinii 801 102 102  
(opłata zgodna z taryfą operatora)



## OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Kod OWU: TUGP55

Zarząd PZU Życie SA ustalił ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, uchwałą nr UZ/202/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku (zwane dalej OWU).

OWU wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Ubezpieczający przed zawarciem umowy powinien dokładnie zapoznać się z OWU oraz przekazać OWU każdemu, kto chce przystąpić do ubezpieczenia.

**Zanim przystąpisz do ubezpieczenia, zapoznaj się dokładnie z OWU otrzymanymi od ubezpieczającego.**

### SŁOWNICZEK

– czyli co oznaczają użyte terminy

1. W OWU używamy terminów:
  - 1) **okres ochrony** – czas, w którym trwa nasza odpowiedzialność wobec ubezpieczonego z tytułu ubezpieczenia dodatkowego;
  - 2) **trwały uszczerbek na zdrowiu** – to nieodwracalne uszkodzenie strukturalne organu, narządu lub układu bądź też trwałe upośledzenie ich funkcji, które nie ulegnie poprawie pod wpływem leczenia ani rehabilitacji;
  - 3) **ubezpieczenie dodatkowe** – umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają niniejsze OWU;
  - 4) **ubezpieczenie podstawowe** – umowa grupowego ubezpieczenia PZU Na Życie Plus, do której ubezpieczający może zawrzeć ubezpieczenie dodatkowe.
2. Pozostałe terminy, które stosujemy w tych OWU, zdefiniowaliśmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego – terminów tych używamy w takim samym znaczeniu.

### PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

– czyli co ubezpieczamy

3. Ubezpieczamy Twoje zdrowie.

### ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

– czyli za jakie zdarzenie zapłacimy i ile

4. Zakres ubezpieczenia dodatkowego obejmuje wystąpienie u Ciebie trwałego uszczerbku na zdrowiu, który powstał w wyniku nieszczęśliwego wypadku w okresie ochrony.
5. W razie wystąpienia u Ciebie trwałego uszczerbku na zdrowiu, za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacimy świadczenie równe określonej w polisie i w indywidualnym potwierdzeniu ubezpieczenia procentowi sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
6. Prawo do wypłaty świadczenia przysługuje:
  - 1) jeśli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy między nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu;
  - 2) maksymalnie za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu jednego nieszczęśliwego wypadku.

### WYŁĄCZENIA OCHRONY

– czyli w jakich sytuacjach nie otrzymasz świadczenia

7. Dla celów określenia wyłączeń naszej ochrony używamy terminu **wyczynowe uprawianie sportu** – jest to uprawianie dyscyplin sportowych przez:
  - 1) członków kadry klubów, którzy biorą udział w rozgrywkach profesjonalnych, ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Rozgrywki te muszą organizować: związek sportowy lub federacja sportu zawodowego właściwe dla danej dyscypliny – lub

- 2) osoby, które uprawiają sporty indywidualne i biorą udział w rozgrywkach profesjonalnych, ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Rozgrywki te muszą organizować: związek sportowy lub federacja sportu zawodowego właściwe dla danej dyscypliny – lub
- 3) osoby, które otrzymują wynagrodzenie, a także stypendium lub zwrot kosztów związanych z uprawianiem sportu indywidualnego lub gier zespołowych (diety, zasilki) – na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
8. Nasza odpowiedzialność nie obejmuje trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeśli nieszczęśliwy wypadek wydarzył się przed początkiem okresu ochrony lub wydarzył się:
  - 1) w wyniku działań wojennych;
  - 2) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
  - 3) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
  - 4) w wyniku wypadku komunikacyjnego – jeśli ubezpieczony prowadził pojazd:
    - a) nie mając uprawnień do prowadzenia pojazdu, które są określone w przepisach prawa lub
    - b) będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub po użyciu: narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,– o ile którakolwiek z tych okoliczności miała wpływ na zajście wypadku komunikacyjnego;
  - 5) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub po użyciu: narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – o ile którakolwiek z tych okoliczności miała wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku;
  - 6) w wyniku samookaleczenia się ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego;
  - 7) bezpośrednio w wyniku zatrucia spożytym alkoholem lub użytymi narkotykami, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub środkami zastępczymi – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  - 8) w wyniku użycia przez ubezpieczonego produktów leczniczych niezgodnie z zaleceniem lekarza albo niezgodnie z informacją zamieszczoną w ulotce dołączonej do produktu leczniczego;
  - 9) ponieważ ubezpieczony uprawiał sport wyczynowo.
9. Nasza odpowiedzialność nie obejmuje wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego wskutek uszkodzeń ciała, które były spowodowane leczeniem lub zabiegami diagnostycznymi, bez względu na to, kto je wykonywał – chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.

## **SUMA UBEZPIECZENIA**

– czym jest i gdzie wskazujemy jej wysokość

10. Suma ubezpieczenia jest to kwota, na podstawie której ustalamy wysokość wypłacanego świadczenia.
11. Wysokość sumy ubezpieczenia znajduje się w polisie oraz w indywidualnym potwierdzeniu ubezpieczenia.
12. Suma ubezpieczenia jest stała przez cały okres umowy. Suma ubezpieczenia może ulec zmianie za porozumieniem stron.

## **SKŁADKA**

– od czego zależy i kiedy ją opłacać

13. Wysokość składki za ubezpieczonego:
  - 1) jest stała, ale może ulec zmianie za porozumieniem stron;
  - 2) zależy od:
    - a) sumy ubezpieczenia,
    - b) wysokości świadczenia,
    - c) liczby, struktury wieku i płci osób, które przystępują do ubezpieczenia, a także rodzaju wykonywanej przez nie pracy.
14. Wysokość składki za ubezpieczenie dodatkowe określamy we wniosku o zawarcie umowy i w polisie.
15. Ubezpieczający przekazuje nam składki za ubezpieczenie dodatkowe z częstotliwością miesięczną, razem ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

## **ZAWIERANIE UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO I PRZYSTĘPOWANIE DO NIEGO**

– czyli w jaki sposób Cię ubezpieczamy

16. Ubezpieczenie dodatkowe może być zawarte wraz z zawarciem ubezpieczenia podstawowego albo w trakcie jego trwania.
17. Do ubezpieczenia dodatkowego mogą przystąpić ubezpieczeni, którzy przystąpili do ubezpieczenia podstawowego.

## **CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO**

– czyli na jaki okres zawieramy ubezpieczenie dodatkowe

18. Ubezpieczający może zawrzeć z nami ubezpieczenie dodatkowe na czas określony. Czas trwania ubezpieczenia dodatkowego potwierdzamy w polisie. Jeśli ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest pomiędzy rocznicami polisy, to nasza ochrona trwa do najbliższej rocznicy polisy.

## **PRZEDŁUŻENIE UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO**

– czyli jakie są zasady przedłużenia ubezpieczenia dodatkowego

19. Jeśli żadna ze stron umowy nie postanowi inaczej i pod warunkiem obowiązywania ubezpieczenia podstawowego, ubezpieczenie dodatkowe przedłuża się na kolejny rok polisowy automatycznie – na tych samych warunkach. W takim przypadku jako ubezpieczony nie musisz ponownie składać nam deklaracji przystąpienia.
20. Każda ze stron może zrezygnować z przedłużenia ubezpieczenia dodatkowego, o czym powinna powiadomić pisemnie drugą stronę. Należy to zrobić najpóźniej 30 dni przed zakończeniem tego ubezpieczenia.

## **ODSTĄPIENIE OD UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO**

– czyli na jakich zasadach ubezpieczający może się wycofać z ubezpieczenia dodatkowego

21. Odstąpienie od ubezpieczenia dodatkowego odbywa się na zasadach opisanych w ubezpieczeniu podstawowym.
22. Jeśli ubezpieczający odstąpi od ubezpieczenia podstawowego, to skutkuje to odstąpieniem od ubezpieczenia dodatkowego.
23. Jeśli ubezpieczający odstąpi od ubezpieczenia dodatkowego, to nie skutkuje to odstąpieniem od ubezpieczenia podstawowego.

## **WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO**

– czyli jak ubezpieczający może zrezygnować z ubezpieczenia dodatkowego

24. Wypowiedzenie ubezpieczenia dodatkowego odbywa się na zasadach opisanych w ubezpieczeniu podstawowym.
25. Jeśli ubezpieczający wypowie ubezpieczenie podstawowe, to skutkuje to wypowiedzeniem ubezpieczenia dodatkowego.
26. Jeśli ubezpieczający wypowie ubezpieczenie dodatkowe, to nie skutkuje to wypowiedzeniem ubezpieczenia podstawowego.

## **POCZĄTEK NASZEJ OCHRONY**

– czyli od kiedy Cię ubezpieczamy

27. Ochrona w ubezpieczeniu dodatkowym rozpoczyna się zgodnie z zasadami opisanymi w ubezpieczeniu podstawowym.
28. Ochrona w ubezpieczeniu dodatkowym rozpocznie się tylko wtedy, gdy obowiązuje ochrona w ubezpieczeniu podstawowym.

## **KONIEC NASZEJ OCHRONY**

– czyli kiedy kończy się ubezpieczenie dodatkowe

29. Ochrona w ubezpieczeniu dodatkowym kończy się:
  - 1) z dniem zakończenia ochrony w ubezpieczeniu podstawowym;
  - 2) z dniem, w którym otrzymamy oświadczenie ubezpieczającego, że odstępuje od ubezpieczenia dodatkowego;
  - 3) z dniem zakończenia ochrony w ubezpieczeniu dodatkowym – jeśli nie jest przedłużane;
  - 4) z ostatnim dniem miesiąca, w którym rezygnujesz z ubezpieczenia dodatkowego;
  - 5) z końcem miesiąca obowiązywania ubezpieczenia dodatkowego na dotychczasowych warunkach, jeśli nie wyraziłeś wymaganej zgody na zmianę ubezpieczenia dodatkowego;
  - 6) z dniem, w którym upływa okres wypowiedzenia ubezpieczenia dodatkowego;
  - 7) z dniem, w którym ubezpieczenie dodatkowe ulega rozwiązaniu.

## **UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA**

– czyli komu należy się wypłata

30. Prawo do świadczenia przysługuje Tobie.

## **REALIZACJA ŚWIADCZENIA**

– czyli kiedy wypłacimy Ci świadczenie

31. Jeśli wystąpi u Ciebie trwały uszczerbek na zdrowiu, dostarcz nam:
  - 1) wniosek o wypłatę świadczenia,
  - 2) taką dokumentację medyczną, która potwierdza wystąpienie trwałego uszczerbku oraz okoliczności, w jakich do niego doszło.
32. Jeśli dostarczone dokumenty nie wystarczą do tego, aby uznać, że wypłata świadczenia Ci się należy i w jakiej wysokości, możemy poprosić Cię o inne niezbędne dokumenty.
33. Możemy dodatkowo:
  - 1) poprosić o opinię lekarza, którego wskażemy;
  - 2) zlecić badania medyczne– jeśli będzie to potrzebne.
34. Pokrywamy koszty opinii lekarza oraz badań medycznych, które zlecamy.

35. Jeśli dokumenty, o które prosiłimy, są w innym języku niż polski, musisz dostarczyć nam ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie to musi wykonać tłumacz przysięgły.
36. O wypłacie świadczenia decydujemy na podstawie dostarczonej dokumentacji.
37. Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalamy, jeśli z medycznego punktu widzenia następstwa nieszczęśliwego wypadku są trwałe i nie ulegną poprawie pod wpływem leczenia ani rehabilitacji i wypłacamy pełną kwotę świadczenia.
38. Jeśli nie jest możliwe określenie ostatecznej wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalamy bezsporną część tego uszczerbku, czyli taką, która nie ulegnie zmianie bez względu na dalsze leczenie i rehabilitację i wypłacamy kwotę świadczenia, do której nie było żadnych wątpliwości. Oceny końcowej trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonujemy nie później niż na 24 miesiące od wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
39. Zmiana wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu po 24 miesiącu od wystąpienia nieszczęśliwego wypadku nie jest podstawą do zmiany wysokości świadczenia.
40. Jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku został uszkodzony organ, narząd lub układ, który był już wcześniej uszkodzony, to wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalamy jako różnicę pomiędzy stanem po nieszczęśliwym wypadku a stanem istniejącym bezpośrednio przed nieszczęśliwym wypadkiem.
41. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalamy w oparciu o Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tabela jest załącznikiem do OWU.
42. Gdy ustalamy wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie bierzemy pod uwagę rodzaju pracy ani czynności, jakie wykonujesz.
43. Pieniądze za trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem wypłacamy jednorazowo w pełnej należnej kwocie – z uwzględnieniem pkt 6 i 38.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

– czyli co jeszcze jest ważne

44. W sprawach, których nie reguluje ubezpieczenie dodatkowe, stosuje się ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy Kodeksu cywilnego, „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej” oraz inne przepisy prawa.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA**  
**NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO**  
**SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM**

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| a) uszkodzenie powłok czaszki – w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1–10                          |
| Pozbawienie owłosienia (w zależności od obszaru):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| b) poniżej 25% powierzchni skóry owłosionej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1–10                          |
| c) od 25% do 75% powierzchni skóry owłosionej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11–20                         |
| d) powyżej 75% powierzchni skóry owłosionej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21–30                         |
| <b>UWAGA:</b><br>W przypadku uzupełnienia ubytku skóry owłosionej przeszczepem skóry oraz odtworzenia własnego owłosienia należy oceniać wg punktu 1 a. W przypadku skutecznej replantacji skalpu oceniać wg punktu 1a.                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <b>2. Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłobienia, szczeliny, fragmentacja) – w zależności od rozległości uszkodzeń:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| a) bez wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1–10                          |
| b) z nawracającym płynotokiem nosowym i/lub usznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10–30                         |
| <b>3. Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni – w zależności od rozmiarów:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| a) poniżej 10 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1–10                          |
| b) od 10 do 50 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11–15                         |
| c) powyżej 50 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16–25                         |
| <b>UWAGA:</b><br>Jeżeli powstały ubytek kości został uzupełniony operacją plastyczną z dobrym efektem, odsetek trwałego uszczerbku na zdrowiu oceniony za pierwotny ubytek – należy zmniejszyć o połowę.<br>Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), należy osobno oceniać stopień uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości wg poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki wg poz. 1. |                               |
| <b>4. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczerwcowej leczonej operacyjnie, przepukliny mózgowej – ocenia się dodatkowo – w zależności od rodzaju i stopnia powikłań:</b>                                                                                                                                                                                                                          | 1–25                          |
| <b>5. Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| a) porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0–1° wg skali Lovette'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                           |
| b) głęboki niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych znacznie utrudniający sprawność kończyn 2° lub 2/3° wg skali Lovette'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60–80                         |
| c) średniego stopnia niedowład połowiczny lub niedowład obu kończyn dolnych 3° lub 3/4° wg skali Lovette'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40–60                         |
| d) nieznacznego stopnia (niewielki, dyskretny) niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych 4° lub 4/5° wg skali Lovette'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10–40                         |
| e) porażenie kończyny górnej 0–1° wg skali Lovette'a z niedowładem kończyny dolnej 3–4° wg skali Lovette'a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| prawej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70–90                         |
| lewej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60–80                         |
| f) niedowład kończyny górnej 3–4° wg skali Lovette'a z porażeniem kończyny dolnej 0–1° wg skali Lovette'a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| prawej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70–90                         |
| lewej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60–80                         |

|                                                                                             | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| g) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 0–1° wg skali Lovette'a:    |                               |
| prawa                                                                                       | 40–50                         |
| lewa                                                                                        | 30–40                         |
| h) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 2°–2/3° wg skali Lovette'a: |                               |
| prawa                                                                                       | 30–40                         |
| lewa                                                                                        | 25–30                         |
| i) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 3–4° wg skali Lovette'a:    |                               |
| prawa                                                                                       | 10–30                         |
| lewa                                                                                        | 5–20                          |
| j) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 0° wg skali Lovette'a:      |                               |
|                                                                                             | 50                            |
| k) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 1–2° wg skali Lovette'a:    |                               |
|                                                                                             | 30–50                         |
| l) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 3–4° wg skali Lovette'a     |                               |
|                                                                                             | 10–30                         |

**UWAGA:**

W przypadku współistnienia zaburzeń mowy o typie afazji oceniać dodatkowo wg punktu 11, uwzględniając, że całkowity uszczerbek na zdrowiu z tytułu uszkodzenia mózgu nie może przekroczyć 100%.

W przypadku współistnienia deficytu ruchowego z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9. W przypadku różnicy w nasileniu niedowładu pomiędzy kończynami dolnymi, należy oceniać wg punktu 5 g oddzielnie dla każdej kończyny.

**SKALA LOVETTE'A**

- 0° – brak czynnego skurczu mięśnia – brak siły mięśniowej, 1° – ślad czynnego skurczu mięśnia – 10% prawidłowej siły mięśniowej, 2° – wyraźny skurcz mięśnia i zdolność wykonania ruchu przy pomocy i odciążeniu odcinka ruchomego – 25% prawidłowej siły mięśniowej, 3° – zdolność do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciężkości danego odcinka – 50% prawidłowej siły mięśniowej, 4° – zdolność do wykonania czynnego ruchu z pewnym oporem – 75% prawidłowej siły mięśniowej, 5° – prawidłowa siła, tj. zdolność wykonywania czynnego ruchu z pełnym oporem – 100% prawidłowej siły mięśniowej

**6. Izolowane zespoły pozapiramidowe:**

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich | 100   |
| b) zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, itp.                            | 40–80 |
| c) zaznaczony zespół pozapiramidowy                                                                          | 5–30  |

**7. Zaburzenia równowagi i inne poza niedowładem zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria, inne objawy zespołu mózdkowego) pochodzenia mózgowego:**

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| a) uniemożliwiające chodzenie                                      | 100   |
| b) utrudniające w dużym stopniu chodzenie i sprawność ruchową      | 50–80 |
| c) utrudniające w miernym stopniu chodzenie i sprawność ruchową    | 10–40 |
| d) utrudniające w niewielkim stopniu chodzenie i sprawność ruchową | 1–10  |

**8. Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu:**

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| a) padaczka z bardzo częstymi napadami – 3 napady w tygodniu i więcej | 50–60 |
| b) padaczka z napadami – powyżej 2 na miesiąc                         | 30–50 |
| c) padaczka z napadami – 2 i mniej na miesiąc                         | 10–30 |
| d) padaczka z napadami o różnej morfologii – bez utrat przytomności   | 1–10  |



|  | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|--|-------------------------------|
|--|-------------------------------|

**UWAGA:**

Podstawą rozpoznania padaczki są: powtarzające się napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja z przebiegu leczenia, ustalone rozpoznanie przez lekarza leczącego.

W przypadku współistnienia padaczki z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9.

**9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie) w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych:**

|                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) ciężkie zaburzenia psychiczne i neurologiczne uniemożliwiające samodzielną egzystencję              | 80–100 |
| b) encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub dużym deficytem neurologicznym                 | 50–80  |
| c) encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub deficytem neurologicznym o średnim nasileniu   | 30–50  |
| d) encefalopatia z niewielkimi zmianami charakterologicznymi i/lub niewielkim deficytem neurologicznym | 10–30  |

**UWAGA:**

Rozpoznanie encefalopatii powinno być potwierdzone występowaniem deficytu w stanie neurologicznym i psychicznym, udokumentowane badaniem psychiatrycznym, psychologicznym i neurologicznym oraz zmiany w obrazie EEG, TK lub NMR.

**10. Nerwice i inne utrwalone skargi subiektywne powstałe w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub po ciężkim uszkodzeniu ciała:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a) skargi subiektywne związane z urazem głowy lub z ciężkim uszkodzeniem innych części ciała w zależności od stopnia zaburzeń (nawracające bóle i zawroty głowy, męczliwość, nadpobudliwość, osłabienie pamięci, trudności w skupieniu uwagi, bezsenność itp.) | 1–5  |
| b) zespół stresu pourazowego, utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym lub po ciężkim uszkodzeniu ciała – w zależności od stopnia zaburzeń, wymagające stałego leczenia psychiatrycznego                                                         | 5–20 |

**11. Zaburzenia mowy:**

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją | 100   |
| b) afazja całkowita motoryczna                                                   | 60    |
| c) afazja średniego i znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się          | 20–40 |
| d) afazja nieznacznego stopnia                                                   | 10–20 |

**12. Zespoły podwzgórzowe i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego (moczówka prosta, cukrzyca, nadczynność tarczycy itp.):**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| a) znacznie upośledzające czynność ustroju    | 40–60 |
| b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju | 20–30 |

**13. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:**

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) z objawami dwojenia obrazu, opadania powieki i zaburzeniami akomodacji      | 20–35 |
| b) z objawami dwojenia obrazu i opadania powieki                               | 10–20 |
| c) z objawami dwojenia obrazu bez opadania powieki                             | 5–15  |
| d) zaburzenia akomodacji lub inne zaburzenia czynności mięśni wewnętrznych oka | 1–15  |

**14. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia:**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| a) czuciowe (w tym neuralgia pourazowa) | 1–10 |
| b) ruchowe                              | 1–10 |
| c) czuciowo-ruchowe                     | 5–20 |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>15. Uszkodzenie nerwu twarzowego:</b>                                                                                                                                                                                                               |  |                               |
| a) obwodowe całkowite z niedomykaniem powieki                                                                                                                                                                                                          |  | 20                            |
| b) obwodowe częściowe w zależności od nasilenia dolegliwości                                                                                                                                                                                           |  | 5–15                          |
| c) izolowane uszkodzenie centralne                                                                                                                                                                                                                     |  | 5–10                          |
| <b>UWAGA:</b><br>Współistnienie uszkodzenia nerwu twarzowego z pęknięciem kości skalistej oceniać wg poz. 48.<br>Uszkodzenie centralne nerwu twarzowego współistniejące z innymi objawami świadczącymi o uszkodzeniu mózgu oceniać wg punktu 5 lub 9.  |  |                               |
| <b>16. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego:</b>                                                                     |  |                               |
| a) niewielkiego stopnia                                                                                                                                                                                                                                |  | 5–10                          |
| b) średniego stopnia                                                                                                                                                                                                                                   |  | 10–25                         |
| c) dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                      |  | 25–50                         |
| <b>17. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia uszkodzenia:</b>                                                                                                                                                |  | 3–15                          |
| <b>18. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego – w zależności od stopnia uszkodzenia:</b>                                                                                                                                              |  | 5–20                          |
| <b>UWAGA:</b><br>Jeżeli uszkodzeniom nerwów czaszkowych towarzyszą inne uszkodzenia mózgu, należy oceniać wg punktu 9.                                                                                                                                 |  |                               |
| <b>19. Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):</b>                                                                                                                                                                                                |  |                               |
| a) oszpeczenia bez zaburzeń funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy                                                                                                                                                     |  | 1–10                          |
| b) oszpeczenia z miernymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji                                                                                                            |  | 5–30                          |
| c) oszpeczenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji                                                                                                    |  | 30–60                         |
| <b>20. Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, uszkodzenia chrząstki, ubytki części miękkich):</b>                                                                                                                                                |  |                               |
| a) uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – blizny i/lub niewielkie zniekształcenie nosa                                                                                                                                                |  | 1–5                           |
| b) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania – znacznego stopnia deformacja nosa lub utrata części nosa                                                                                                                                               |  | 5–15                          |
| c) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu                                                                                                                                |  | 15–20                         |
| d) utrata lub zaburzenia powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszki:                                                                                                                                                                 |  | 1–5                           |
| e) utrata znacznej części nosa lub utrata całkowita (łącznie z kością nosa)                                                                                                                                                                            |  | 20–30                         |
| <b>UWAGA:</b><br>O ile znacznej deformacji nosa towarzyszą blizny nosa, oceniać łącznie wg punktu 20.<br>O ile uszkodzenie nosa, warg, powiek wchodzi w zespół uszkodzeń objętych punktem 19, należy stosować ocenę wg tego punktu (tj. wg punktu 19). |  |                               |
| <b>21. Uszkodzenia w obrębie zębów:</b>                                                                                                                                                                                                                |  |                               |
| a) utrata częściowa korony zęba bez uszkodzeń miazgi – siekacze lub kły                                                                                                                                                                                |  | 1                             |
| b) utrata częściowa korony zęba bez uszkodzeń miazgi – pozostałe zęby                                                                                                                                                                                  |  | 0,5                           |

|                                                                           | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| c) utrata częściowa korony zęba z uszkodzeniem miazgi – siekacze lub kły  | 1,5                           |
| d) utrata częściowa korony zęba z uszkodzeniem miazgi – pozostałe zęby    | 1                             |
| e) całkowita utrata korony zęba z zachowaniem korzenia – siekacze lub kły | 2                             |
| f) całkowita utrata korony zęba z zachowaniem korzenia – pozostałe zęby   | 1,5                           |
| g) całkowita utrata zęba – siekacze lub kły                               | 3                             |
| h) całkowita utrata zęba – pozostałe zęby                                 | 2                             |
| i) pourazowe rozchwanie zęba                                              | 0,5                           |

**22.** Uszkodzenia (złamania, zwichnięcia) kości oczodołu, szczęki, kości jarzmowej, żuchwy, stawu skroniowo-żuchwowego – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, niesymetrii zgryzu, upośledzenia żucia, rozwierania jamy ustnej, zaburzeń czucia:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| a) nieznacznego stopnia | 1–5   |
| b) średniego stopnia    | 5–10  |
| c) znacznego stopnia    | 10–25 |

**UWAGA:**

W przypadku urazu oczodołu z dwojeniem obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku należy oceniać dodatkowo wg punktu 26 b, w przypadku zaburzeń ostrości wzroku według tabeli 26 a.

W przypadku pojawienia się dużych deficytów neurologicznych dotyczących unerwienia twarzy orzekać dodatkowo z punktu właściwego dla danego nerwu.

Jeżeli uszkodzeniu kości twarzoczaszki towarzyszy oszpeccenie, oceniać jedynie wg punktu 19.

W przypadku złamania żuchwy z innymi kośćmi twarzoczaszki, następstwa uszkodzeń żuchwy oceniać oddzielnie od złamania pozostałych kości twarzoczaszki – dodatkowo z punktu 22 lub 23.

**23.** Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpecceniem i utratą zębów – w zależności od wielkości ubytków, oszpeccenia i powikłań:

|              |       |
|--------------|-------|
| a) częściowa | 15–35 |
| b) całkowita | 40–50 |

**24.** Ubytek podniebienia:

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń        | 10–25 |
| b) z dużymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń | 25–40 |

**25.** Urazy języka, przedsionka jamy ustnej, warg, ubytki – w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, zaburzeń mowy, trudności w połykaniu:

|                                                                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) uszkodzenie języka, uszkodzenia przedsionka jamy ustnej, warg w zależności od wielkości uszkodzeń – zmiany i ubytki niewielkiego stopnia | 1–5   |
| b) ubytki języka, uszkodzenia przedsionka jamy ustnej i warg – zmiany i ubytki średniego stopnia upośledzające odżywianie                   | 5–15  |
| c) duże zmiany i ubytki języka – upośledzające mowę i odżywianie w zależności od stopnia                                                    | 15–40 |
| d) całkowita utrata języka                                                                                                                  | 50    |

## B. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU

|  | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|--|-------------------------------|
|--|-------------------------------|

**26.** Obniżenie ostrości wzroku bądź utrata jednego lub obu oczu:

- a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu trwały uszczerbek ocenia się wg tabeli 26 a

TABELA 26A

| Ostrość wzroku oka prawego | 1,0<br>(10/10)              | 0,9<br>(9/10) | 0,8<br>(8/10) | 0,7<br>(7/10) | 0,6<br>(6/10) | 0,5<br>(5/10) | 0,4<br>(4/10) | 0,3<br>(3/10) | 0,2<br>(2/10) | 0,1<br>(1/10) | 0   |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Ostrość wzroku oka lewego  | Procent trwałego uszczerbku |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 1,0<br>(10/10)             | 0                           | 2,5           | 5             | 7,5           | 10            | 12,5          | 15            | 20            | 25            | 30            | 35  |
| 0,9 (9/10)                 | 2,5                         | 5             | 7,5           | 10            | 12,5          | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40  |
| 0,8 (8/10)                 | 5                           | 7,5           | 10            | 12,5          | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45  |
| 0,7 (7/10)                 | 7,5                         | 10            | 12,5          | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50  |
| 0,6 (6/10)                 | 10                          | 12,5          | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55  |
| 0,5 (5/10)                 | 12,5                        | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60  |
| 0,4 (4/10)                 | 15                          | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65  |
| 0,3 (3/10)                 | 20                          | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65            | 70  |
| 0,2 (2/10)                 | 25                          | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65            | 70            | 80  |
| 0,1 (1/10)                 | 30                          | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65            | 70            | 80            | 90  |
| 0                          | 35                          | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65            | 70            | 80            | 90            | 100 |

|                                                                        | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| b) dwojenie obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku                        | 1–10                          |
| c) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wytuszczeniem gałki ocznej | 38                            |

UWAGA:  
Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.  
Wartość uszczerbku w punkcie 26 c obejmuje również oszpecenie związane z wytuszczeniem gałki ocznej.

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 27. Porażenie nastawności (akomodacji) przy braku zaburzeń ostrości wzroku po korekcji: |    |
| a) jednego oka                                                                          | 15 |
| b) obu oczu                                                                             | 30 |

UWAGA:  
W przypadku pseudosoczewkowatości bez zaburzeń ostrości wzroku oceniać wg punktu 27, w przypadku niedających się skorygować zaburzeń ostrości wzroku wg punktu 34.

|                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 28. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:                                                                       |               |
| a) z zaburzeniami ostrości wzroku                                                                                         | wg tabeli 26A |
| b) z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej, blizny rogówki – bez zaburzeń ostrości wzroku | 1–5           |

|                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 29. Uszkodzenie gałki ocznej – wskutek urazów drążących oraz nieusunięte ciało obce oczodołu:                             |               |
| a) z zaburzeniami ostrości wzroku                                                                                         | wg tabeli 26A |
| b) z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej, blizny rogówki – bez zaburzeń ostrości wzroku | 1–5           |

|                                                                                                                                                                    | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| c) nieusunięte ciało obce wewnątrzgałkowe z obniżeniem ostrości wzroku                                                                                             | wg tabeli 26A + 10%           |
| d) nieusunięte ciało obce wewnątrzgałkowe bez obniżenia ostrości wzroku                                                                                            | 10                            |
| e) nieusunięte ciało obce oczodołu                                                                                                                                 | 1–5                           |
| <b>30. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną:</b>           |                               |
| a) w zależności od zaburzeń ostrości wzroku                                                                                                                        | wg tabeli 26A                 |
| b) bez zaburzeń ostrości wzroku                                                                                                                                    | 1–5                           |
| <b>31. Koncentryczne zwężenie pola widzenia oceniać wg poniższej tabeli 31 w zależności od – mniej lub bardziej korzystnej lokalizacji zwężenia pola widzenia.</b> |                               |

**TABELA 31**

| Zwężenie do | Przy nienaruszonym drugim oku | W obu oczach | Przy ślepotcie drugiego oka |
|-------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 60°         | 0                             | 0            | 20–35%                      |
| 50°         | 1–5%                          | 10–15%       | 35–45%                      |
| 40°         | 5–10%                         | 15–25%       | 45–55%                      |
| 30°         | 10–15%                        | 25–50%       | 55–70%                      |
| 20°         | 15–20%                        | 50–80%       | 70–85%                      |
| 10°         | 20–25%                        | 80–90%       | 85–95%                      |
| poniżej 10° | 25–35%                        | 90–95%       | 95–100%                     |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>32. Połowicze i inne niedowidzenia:</b>                                          |     |
| a) dwuskroniowe                                                                     | 60  |
| b) dwunosowe                                                                        | 30  |
| c) jednoimienne                                                                     | 30  |
| d) inne ubytki pola widzenia (jednooczne)                                           | 1–5 |
| <b>33. Bezsoczewkowość bez współistnienia zaburzeń ostrości wzroku po korekcji:</b> |     |
| a) w jednym oku                                                                     | 25  |
| b) w obu oczach                                                                     | 40  |

**UWAGA:**

W przypadku gdy współistnieją niedające się skorygować zaburzenia ostrości wzroku, ocenia się dodatkowo wg tabeli 26 a z ograniczeniem do 35% dla jednego oka i 100% za oba oczy.

|                                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>34. Pseudosoczewkowość przy współistnieniu niepoddających się korekcji zaburzeń ostrości wzroku:</b> |                                   |
| a) w jednym oku                                                                                         | wg tabeli 26 a w granicach 15–35  |
| b) w obu oczach                                                                                         | wg tabeli 26 a w granicach 30–100 |
| <b>35. Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie) – w zależności od stopnia i natężenia:</b>  |                                   |
| a) w jednym oku                                                                                         | 5–10                              |
| b) w obu oczach                                                                                         | 10–15                             |
| <b>36. Odwarstwienie siatkówki jednego oka – oceniać wg tabeli 26a i 31 nie mniej niż:</b>              | 15                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>37. Jaskra:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| a) bez zaburzeń pola widzenia i ostrości wzroku                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                             |
| b) z zaburzeniem pola widzenia i ostrości wzroku oceniać wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26 a) oraz tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia (poz. 31), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent uszczerbku nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oba oczy                                                              |                               |
| <b>38. Wytrzeszcz tęczniący – w zależności od stopnia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50–100                        |
| <b>39. Zażyma urazowa – oceniać wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26 a).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| <b>40. Przewlekłe zapalenie spojówek, uszkodzenia powiek (oparzenia, urazy itp.):</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| a) niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1–5                           |
| b) duże zmiany, blizny i zrosty powiek powodujące niedomykalność                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5–10                          |
| <b>UWAGA:</b><br>Suma orzeczonego uszczerbku na zdrowiu z tytułu uszkodzeń poszczególnych struktur oka nie może przekroczyć wartości uszczerbku przewidzianej za całkowitą utratę wzroku w jednym oku (35%) lub w obu oczach (100%).<br>Jeżeli uraz powiek wchodzi w skład uszkodzeń innych części twarzy, oceniać według punktu 19 lub 22. |                               |

## C. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU

|                                                                                            |         |          |          | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------------|
| 41. Upośledzenie ostrości słuchu:                                                          |         |          |          |                               |
| a) Przy upośledzeniu ostrości słuchu trwałe uszczerbek ocenia się wg niżej podanej tabeli: |         |          |          |                               |
| TABELA 41 A                                                                                |         |          |          |                               |
| Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosera (w mod.)    |         |          |          |                               |
| Ucho prawe<br>Ucho lewe                                                                    | 0-25 dB | 26-40 dB | 41-70 dB | Pow. 70 dB                    |
| 0-25 dB                                                                                    | 0       | 5%       | 10%      | 20%                           |
| 26-40 dB                                                                                   | 5%      | 15%      | 20%      | 30%                           |
| 41-70 dB                                                                                   | 10%     | 20%      | 30%      | 40%                           |
| pow. 70 dB                                                                                 | 20%     | 30%      | 40%      | 50%                           |

### UWAGA:

Oblicza się oddzielnie średnią dla ucha prawego i lewego, biorąc pod uwagę częstotliwości dla 500, 1000 i 2000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 dB, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z czterech progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 dB, ale próg słyszalności dla 4000 Hz jest lepszy niż dla 2000 Hz, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z trzech progów 500, 1000, 4000 Hz.

|                                                                                                                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b) pourazowe szumy uszne – w zależności od stopnia nasilenia                                                                                                                              | 1–5  |
| <b>UWAGA:</b><br>Jeżeli szum uszny towarzyszy deficytowi słuchu, należy oceniać wyłącznie według tabeli 41 a, natomiast jeżeli towarzyszy zaburzeniom równowagi, to oceniać wg punktu 47. |      |
| <b>42. Urazy małżowiny usznej:</b>                                                                                                                                                        |      |
| a) zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) lub utrata części małżowiny – w zależności od stopnia uszkodzeń                                                             | 1–10 |
| b) całkowita utrata jednej małżowiny                                                                                                                                                      | 15   |
| c) całkowita utrata obu małżowin                                                                                                                                                          | 30   |

|                                                                                                                                                 | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>43.</b> Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego – jednostronne lub obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu:      | oceniać wg tabeli 41A         |
| <b>44.</b> Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego:                                                                                          |                               |
| a) jednostronne                                                                                                                                 | 5                             |
| b) obustronne                                                                                                                                   | 10                            |
| <b>45.</b> Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha – w zależności od stopnia powikłań: |                               |
| a) jednostronne                                                                                                                                 | 5–15                          |
| b) obustronne                                                                                                                                   | 10–20                         |
| <b>46.</b> Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych:                                                                 |                               |
| a) bez upośledzenia słuchu, w zależności od blizn, zniekształceń                                                                                | 1–5                           |
| b) z upośledzeniem słuchu                                                                                                                       | Oceniać wg tabeli 41A         |
| <b>47.</b> Uszkodzenie ucha wewnętrznego:                                                                                                       |                               |
| a) z uszkodzeniem części słuchowej                                                                                                              | Oceniać wg tabeli 41A         |
| b) z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, nudności, niewielkie zaburzenia równowagi)                                                  | 1–20                          |
| c) z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, zaburzenia równowagi utrudniające poruszanie się, nudności, wymioty)                        | 20–50                         |
| d) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia                                                           | 30–60                         |
| <b>48.</b> Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:                                                                   |                               |
| a) jednostronne – w zależności od stopnia uszkodzenia                                                                                           | 10–25                         |
| b) dwustronne                                                                                                                                   | 25–60                         |

#### D. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZĘŁYKU

|                                                                                                                                                                        | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>49.</b> Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji:                                                                                                                 | 5–10                          |
| <b>50.</b> Uszkodzenie lub zwężenie krtani, uszkodzenie nerwów krtaniowych, pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej – w zależności od stopnia uszkodzenia: |                               |
| a) niewielka okresowa duszność, chrypka                                                                                                                                | 5–10                          |
| b) świsł krtaniowy, duszność przy umiarkowanych wysiłkach, zachłystywanie się                                                                                          | 10–30                         |
| <b>51.</b> Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej:                                                                               |                               |
| a) z zaburzeniami głosu – w zależności od stopnia                                                                                                                      | 35–50                         |
| b) z bezgłosem                                                                                                                                                         | 60                            |
| <b>52.</b> Uszkodzenie tchawicy – w zależności od stopnia jej zwężenia:                                                                                                |                               |
| a) bez niewydolności oddechowej                                                                                                                                        | 1–10                          |
| b) duszność w trakcie wysiłku fizycznego                                                                                                                               | 10–20                         |
| c) duszność w trakcie chodzenia po poziomym odcinku drogi wymagająca okresowego zatrzymania się w celu nabrania powietrza                                              | 20–40                         |
| d) duże zwężenie potwierdzone badaniem bronchoskopowym z dusznością spoczynkową                                                                                        | 40–60                         |
| <b>53.</b> Uszkodzenie przełyku:                                                                                                                                       |                               |
| a) ze zwężeniem bez zaburzeń w odżywianiu                                                                                                                              | 1–5                           |

|                                                                                                                          | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| b) z częściowymi trudnościami w odżywianiu – w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania                       | 5–30                          |
| c) odżywianie tylko płynami                                                                                              | 50                            |
| d) całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową                                                            | 80                            |
| <b>54. Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni, naczyń – w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy:</b> |                               |
| a) zmiany niewielkiego stopnia                                                                                           | 1–5                           |
| b) zmiany średniego stopnia                                                                                              | 5–15                          |
| c) rozległe blizny, w znacznym stopniu ograniczona ruchomość szyi z niesymetrycznym ustawieniem głowy                    | 15–30                         |
| <b>UWAGA:</b><br>Uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego oceniać wg punktu 89.       |                               |

#### **E. USZKODZENIA KŁATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA**

|                                                                                                                                                                      | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>55. Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu – w zależności od zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania:</b> |                               |
| a) zniekształcenia, ubytki i blizny nieograniczające ruchomości klatki piersiowej                                                                                    | 1–5                           |
| b) mierne ograniczenie ruchomości klatki piersiowej – blizny, ubytki mięśniowe z niewielkim zmniejszeniem wydolności oddechowej                                      | 5–10                          |
| c) średniego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej – blizny, ubytki mięśniowe ze średnim zmniejszeniem wydolności oddechowej                             | 10–25                         |
| d) znacznego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, rozległe ściąające blizny, duże ubytki mięśniowe ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej     | 25–40                         |
| <b>UWAGA:</b><br>Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej zawarte są w uwadze po punkcie 62.                                                                       |                               |
| <b>56. Utrata brodawki:</b>                                                                                                                                          |                               |
| a) częściowa w zależności od rozległości blizn                                                                                                                       | 1–10                          |
| b) całkowita utrata brodawki – w zależności od płci i wieku                                                                                                          | 10–15                         |
| <b>UWAGA:</b><br>Stopień uszczerbku na zdrowiu po całkowitej utracie brodawki oceniać również wg przewidywanej utraty funkcji.                                       |                               |
| <b>57. Uszkodzenie lub utrata sutka w zależności od wielkości ubytków i blizn:</b>                                                                                   |                               |
| a) częściowe uszkodzenie lub częściowa utrata w zależności od wielkości ubytku                                                                                       | 5–15                          |
| b) całkowita utrata sutka – w zależności od płci i wieku                                                                                                             | 20–25                         |
| c) utrata sutka z częścią mięśnia piersiowego w zależności od płci i wieku                                                                                           | 30–35                         |
| <b>UWAGA:</b><br>Stopień uszczerbku na zdrowiu po całkowitej utracie sutka oceniać również wg przewidywanej utraty funkcji.                                          |                               |
| <b>58. Złamania żeber:</b>                                                                                                                                           |                               |
| a) żebra – bez zniekształceń                                                                                                                                         | 1                             |
| b) żeber – bez zniekształceń, bez zmniejszenia wydolności oddechowej                                                                                                 | 2–5                           |
| c) żebra lub żeber z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia wydolności oddechowej                                                                               | 2–10                          |
| d) złamania żeber z miernym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej – z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej                                  | 5–10                          |



|                                                                                                                                              | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| e) złamania żeber ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej – ze średniego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej | 10–25                         |
| f) złamania żeber ze znacznego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej, ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej           | 25–40                         |

**UWAGA:**

Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej zawarte są w uwadze po punkcie 62.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>59. Złamanie mostka:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| a) bez zniekształceń                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1–3   |
| b) z obecnością zniekształceń                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3–10  |
| <b>60. Złamania żeber lub mostka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), przetokami – ocenia się wg poz. 58–59, zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji o:</b> | 1–15  |
| <b>61. Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):</b>                                                                                                                                                                                    |       |
| a) uszkodzenie płuc i opłucnej bez cech niewydolności oddechowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 1–5   |
| b) z objawami niewydolności oddechowej niewielkiego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                       | 5–10  |
| c) z objawami niewydolności oddechowej średniego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                          | 10–25 |
| d) z niewydolnością oddechową znacznego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25–40 |
| <b>62. Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej:</b>                                                                                                                                                                         | 40–80 |

**UWAGA:**

Przy ocenie wg punktów 55, 58, 61 i 62 poza badaniem rentgenowskim, uszkodzenia tkanki płucnej i stopnie niewydolności oddechowej muszą być potwierdzone badaniem spirometrycznym i/lub badaniem gazometrycznym.

W przypadku gdy następstwa obrażeń klatki piersiowej są oceniane z kilku punktów tabeli, a niewydolność oddechowa towarzyszy tym następstwom, trwałe uszczerbek na zdrowiu wynikający ze stopnia niewydolności oddechowej ustala się wyłącznie w oparciu o jeden z tych punktów.

**STOPNIE UPOŚLEDZENIA WYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ:**

- niewielkiego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej – VC 70–80%, FEV1 70–80%, FEV1%VC – 70–80% – w odniesieniu do wartości należnych,
- średniego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej – VC 50–70%, FEV1 50–70%, FEV1%VC 50–70% – w odniesieniu do wartości należnych,
- znaczne zmniejszenie wydolności oddechowej – VC poniżej 50%, FEV1 poniżej 50%, FEV1%VC poniżej 50% – w odniesieniu do wartości należnych.

|                                                                                           | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>63. Uszkodzenie serca lub osierdzia:</b>                                               |                               |
| a) z wydolnym układem krążenia, EF powyżej 55%, powyżej 10 MET, bez zaburzeń kurczliwości | 5–10                          |
| b) I klasa NYHA, EF 50–55%, powyżej 10 MET, niewielkie zaburzenia kurczliwości            | 10–20                         |
| c) II klasa NYHA, EF 45%–55% 7–10 MET, umiarkowane zaburzenia kurczliwości                | 20–40                         |
| d) III klasa NYHA, EF 35%–45%, 5–7 MET, nasilone zaburzenia kurczliwości                  | 40–60                         |
| e) IV klasa NYHA, EF <35%, poniżej 5 MET, znaczne zaburzenia kurczliwości                 | 60–90                         |

**UWAGA:**

Stopień wydolności układu krążenia musi być oceniony na podstawie badania klinicznego, badań obrazowych serca i/lub badania EKG wysiłkowego. Przy zaliczaniu następstw do poszczególnych podpunktów muszą być spełnione co najmniej dwa kryteria.

## KLASYFIKACJA NYHA – KLASYFIKACJA NOWOJORSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO WYRÓŻNIA NASTĘPUJĄCE STANY CZYNNOŚCIOWE SERCA:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasa I.</b>   | Choroba serca bez ograniczenia fizycznej aktywności. Podstawowa aktywność fizyczna nie powoduje zmęczenia, duszności, kołatania serca i bólów wieńcowych.                                                                                               |
| <b>Klasa II.</b>  | Choroba serca powodująca niewielkie ograniczenia aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Podstawowa aktywność powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.                                                               |
| <b>Klasa III.</b> | Choroba serca powodująca ograniczenie aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Mniejsza niż podstawowa aktywność fizyczna powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.                                                    |
| <b>Klasa IV.</b>  | Choroba serca, która przy jakiegokolwiek aktywności fizycznej wywołuje dyskomfort. Objawy niewydolności serca lub niewydolności wieńcowej mogą występować nawet w spoczynku. Jeśli zostanie podjęta jakakolwiek aktywność fizyczna, wzrasta dyskomfort. |

### DEFINICJA EF – FRAKCJA WYRZUTOWA LEWEJ KOMORY:

**Fracja wyrzutowa lewej komory** – ilość krwi wypływająca z lewej komory do układu krążenia podczas skurczu serca.

Fracja wyrzutowa jest zwykle wyrażana w procentach jako stosunek objętości krwi wypływającej w czasie skurczu z lewej komory do całkowitej objętości lewej komory. Fracja wyrzutowa określa zdolność serca do skurczu i jest wykładnikiem wydolności serca. W przypadku choroby serca prowadzącej do jego niewydolności, frakcja wyrzutowa wynosi zwykle poniżej 50%.

### DEFINICJA RÓWNOWAŻNIKA METABOLICZNEGO – MET, STOSOWANEGO PRZY OCENIE PRÓBY WYSIŁKOWEJ:

**MET-y** (MET – równoważnik metaboliczny jest jednostką spoczynkowego poboru tlenu, ok. 3,5 ml tlenu na kilogram masy ciała na minutę) uzyskuje się, dzieląc objętość tlenu (w ml/min) przez iloczyn: masy ciała (w kg) x 3,5. Liczbę 3,5 przyjmuje się jako wartość odpowiadającą zużyciu tlenu w spoczynku i wyraża w mililitrach tlenu na kilogram masy ciała na minutę.

|                                                                                                                                                                       | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>64.</b> Uszkodzenia przepony – rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia: |                               |
| a) bez zaburzeń funkcji – np. po leczeniu operacyjnym                                                                                                                 | 1–5                           |
| b) zaburzenia niewielkiego stopnia                                                                                                                                    | 5–10                          |
| c) zaburzenia średniego stopnia                                                                                                                                       | 10–20                         |
| d) zaburzenia dużego stopnia                                                                                                                                          | 20–40                         |

### F. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA

|                                                                                                                                                                                                                | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>65.</b> Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.), okolicy lędźwiowej i krzyżowej – w zależności od charakteru blizn, ubytków, umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia: |                               |
| a) blizny, niewielkie ubytki tkanek                                                                                                                                                                            | 1–5                           |
| b) rozległe przerośnięte, ściągające blizny, ubytki mięśniowe, przetrwałe przepukliny                                                                                                                          | 5–15                          |
| c) przetoki                                                                                                                                                                                                    | 15–30                         |

#### UWAGA:

Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych).

Nie podlegają orzekaniu przy ustalaniu następstw nieszczęśliwego wypadku przepukliny, do ujawnienia których doszło w wyniku wysiłku fizycznego lub dźwignięcia ciężaru.

|                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>66.</b> Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita:                                                          |      |
| a) bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego                                                                          | 1–5  |
| b) z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji i dostatecznym stanem odżywiania                                       | 5–15 |
| c) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania | 5–40 |

|                                                                                                                                                                                   | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| d) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – odżywianie jedynie pozajelitowe                                                                                 | 50                            |
| <b>67. Przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny – w zależności od możliwości zaopatrzenia sprzętem stomijnym i miejscowych powikłań przetoki:</b>                              |                               |
| a) jelita cienkiego                                                                                                                                                               | 30–80                         |
| b) jelita grubego                                                                                                                                                                 | 20–70                         |
| <b>68. Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy niepowodujące upośledzenia funkcji innych narządów w zależności od rozległości uszkodzenia naczyń:</b>    | 1–10                          |
| <b>69. Uszkodzenie odbytu, zwieracza odbytu:</b>                                                                                                                                  |                               |
| a) blizny, zwężenia, niewielkie dolegliwości                                                                                                                                      | 1–5                           |
| b) powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów                                                                                                                          | 60                            |
| <b>70. Uszkodzenia odbytnicy:</b>                                                                                                                                                 |                               |
| a) pełnościenne uszkodzenie – bez zaburzeń funkcji                                                                                                                                | 1–5                           |
| b) wypadanie błony śluzowej                                                                                                                                                       | 5–10                          |
| c) wypadanie odbytnicy w zależności od stopnia wypadania                                                                                                                          | 10–30                         |
| <b>71. Uszkodzenia śledziony:</b>                                                                                                                                                 |                               |
| a) leczone zachowawczo (krwaki, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)                                                                                              | 2                             |
| b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu                                                                                                                                      | 5                             |
| c) utrata u osób powyżej 18 roku życia                                                                                                                                            | 15                            |
| d) utrata u osób poniżej 18 roku                                                                                                                                                  | 20                            |
| <b>72. Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki – w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji:</b>                                          |                               |
| a) bez zaburzeń funkcjonalnych, utrata pęcherzyka żółciowego                                                                                                                      | 1–5                           |
| b) zaburzenia czynności wątroby w stopniu A wg Childa-Pugha, zaburzenia czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki niewielkiego stopnia lub utrata części narządu                   | 5–15                          |
| c) zaburzenia czynności wątroby w stopniu B wg Childa-Pugha, zaburzenia czynności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej trzustki średniego stopnia lub utrata znacznej części narządu | 15–40                         |
| d) zaburzenia czynności wątroby w stopniu C wg Childa-Pugha, ciężkie zaburzenia czynności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej trzustki                                              | 20–60                         |

**UWAGA:**

Przetokę trzustkową oceniać wg ilości wydzielanej treści, stopnia wydolności zewnątrzwydzielniczej oraz zmian wtórnych powłok jamy brzusznej wg punktu 72 b–d.

Przetokę żółciową oceniać wg ilości wydzielanej treści oraz zmian wtórnych powłok brzusznych wg punktu 72 b–d.

Zwężenia dróg żółciowych orzekać wg częstości nawrotów zapaleń dróg żółciowych oraz zmian wtórnych w wątrobie wg punktu 72 b–d.

**KLASYFIKACJA CHILDA-PUGHA – W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI NALEŻNYCH**

| Parametr                   | Liczba punktów |         |      |
|----------------------------|----------------|---------|------|
|                            | 1              | 2       | 3    |
| Albumina (g/dl) w sur.     | >3,5           | 2,8–3,5 | <2,8 |
| Bilirubina (umol/l) w sur. | <25            | 25–40   | >40  |

|                                       |      |            |          |
|---------------------------------------|------|------------|----------|
| Czas protrombinowy (sek. ponad normę) | <4   | 4–6        | >6       |
| Wodobrzusze                           | brak | niewielkie | nasilone |
| Nasilenie encefalopatii               | brak | I–II°      | III–IV°  |

GRUPA A – 5–6 pkt, GRUPA B – 7–9 pkt, GRUPA C – 10–15 pkt

#### G. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PĘCIOWYCH

|                                                                                                                                                                                                                 |  | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>73. Uszkodzenie nerek:</b>                                                                                                                                                                                   |  |                               |
| a) uszkodzenie nerki bez zaburzeń funkcji (krwaki, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)                                                                                                         |  | 1–5                           |
| b) uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji                                                                                    |  | 10–25                         |
| <b>74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej:</b>                                                                                                                                   |  | 35                            |
| <b>75. Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki:</b>                                                                  |  | 40–75                         |
| <b>76. Uszkodzenie moczowodu, powodujące zwężenie jego światła:</b>                                                                                                                                             |  |                               |
| a) niepowodujące zaburzeń funkcji                                                                                                                                                                               |  | 1–5                           |
| b) z zaburzeniem funkcji układu moczowego                                                                                                                                                                       |  | 5–20                          |
| <b>77. Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych:</b>                                                              |  |                               |
| a) bez zaburzeń funkcji                                                                                                                                                                                         |  | 1–5                           |
| b) niewielkiego i średniego stopnia zaburzenia funkcji                                                                                                                                                          |  | 5–15                          |
| c) znacznego stopnia zaburzenia funkcji                                                                                                                                                                         |  | 15–30                         |
| <b>78. Przetoki górnych dróg moczowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej:</b>                                                                                                                                |  |                               |
| a) upośledzające jakość życia (w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń wtórnych) w stopniu średnim                                                                         |  | 10–25                         |
| b) upośledzające jakość życia (w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń wtórnych) w stopniu znacznym                                                                        |  | 25–50                         |
| <b>79. Zwężenia cewki moczowej:</b>                                                                                                                                                                             |  |                               |
| a) powodujące trudności w oddawaniu moczu, bez nawracających zakażeń                                                                                                                                            |  | 5–15                          |
| b) z nawracającymi zakażeniami                                                                                                                                                                                  |  | 15–30                         |
| c) z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu                                                                                                                                                                   |  | 30–75                         |
| UWAGA:<br>Stopień zaburzeń w oddawaniu moczu powinien być potwierdzony badaniami urodynamicznymi.                                                                                                               |  |                               |
| <b>80. Utrata prącia:</b>                                                                                                                                                                                       |  | 40                            |
| <b>81. Uszkodzenie lub częściowa utrata prącia – w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji:</b>                                                                                                  |  | 5–30                          |
| <b>82. Uszkodzenie lub utrata jednego jądra, jajnika oraz pozostałych struktur układu rozrodczego (nie ujętych w pozostałych punktach tabeli) – w zależności od stopnia uszkodzenia i upośledzenia funkcji:</b> |  | 5–20                          |
| <b>83. Utrata obu jąder lub obu jajników:</b>                                                                                                                                                                   |  | 40                            |

|                                                                            | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>84. Pourazowy wodniak jądra:</b>                                        |                               |
| a) wyleczony operacyjnie                                                   | 2                             |
| b) w zależności od nasilenia zmian                                         | 2–10                          |
| <b>85. Utrata lub uszkodzenie macicy:</b>                                  |                               |
| a) uszkodzenie lub częściowa utrata                                        | 5–20                          |
| b) utrata w wieku do 50 lat                                                | 40                            |
| c) utrata w wieku powyżej 50 lat                                           | 20                            |
| <b>86. Uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, pośladków:</b> |                               |
| a) blizny, ubytki, deformacje                                              | 1–10                          |
| b) wypadanie pochwy                                                        | 5–10                          |
| c) wypadanie pochwy i macicy                                               | 30                            |

#### **H. OSTRE ZATRUCIA, NAGŁE DZIAŁANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, FIZYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH**

|                                                                                                                                                                                                                        | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>87. Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi:</b>                                                                                                                                           |                               |
| a) ze stwierdzoną utratą przytomności, obserwacją szpitalną, lecz bez trwałych wtórnych powikłań                                                                                                                       | 1–5                           |
| b) powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu średnim                                                                                                                                       | 10–20                         |
| c) powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym – oceniać według pozycji odpowiednich dla danego narządu lub układu.                                                                 |                               |
| d) uszkodzenie układu krwiotwórczego                                                                                                                                                                                   | 15–25                         |
| <b>88. Inne następstwa zatruc oraz ogólne następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych (porażenia prądem, porażenia piorunem, następstwa ukąszeń) – w zależności od stopnia uszkodzenia:</b> |                               |
| a) ze stwierdzoną utratą przytomności, obserwacją szpitalną, lecz bez trwałych wtórnych powikłań                                                                                                                       | 1–5                           |
| b) powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu średnim                                                                                                                                       | 5–15                          |
| c) powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym – oceniać według pozycji odpowiednich dla danego narządu lub układu                                                                  |                               |

#### **UWAGA:**

Uszkodzenie wzroku i słuchu oceniać wg odpowiednich tabel 26 a, 31, 41.

Miejscowe następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych oceniać według punktów odpowiednich dla danej okolicy ciała.

#### **I. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA**

|                                                                                                                                                                                                     | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>89. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym:</b>                                                                                                                                                |                               |
| a) skręcenie, stłuczenie, niewielkie uszkodzenie aparatu więzadłowego – z przemieszczeniem kręgów poniżej 3 mm lub niestabilność kątowa poniżej 12° – w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości | 1–5                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| b) ze złamaniem blaszki granicznej lub kompresją trzonu kręgu do 25% wysokości kręgu, inne złamanie kręgu powodujące zniekształcenie średniego stopnia, podwichnięcie (potwierdzone czynnościowymi badaniami RTG), stan po usunięciu jądra miażdżystego, usztywnienie operacyjne – w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości | 5–15                          |
| c) złamanie z kompresją trzonu powyżej 25%, inne złamanie kręgu powodujące zniekształcenie dużego stopnia, zwichnięcie, usztywnienie operacyjne – w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości                                                                                                                                  | 15–40                         |
| d) całkowite zeszczywnienie z niekorzystnym ustawieniem głowy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                            |

**UWAGA:**

Złamanie więcej niż jednego kręgu lub usunięcie więcej niż jednego jądra miażdżystego – oceniać według punktu 89 b lub c w zależności od stopnia zniekształcenia i zaburzenia ruchomości.

Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa szyjnego jest zespół bólowy korzeniowy, orzekać wyłącznie według pozycji 95.

**90. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1–Th11):**

|                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) złamanie blaszki granicznej lub kompresja trzonu kręgu do 25% wysokości kręgu, inne złamanie kręgu powodujące zniekształcenie średniego stopnia, stan po usunięciu jądra miażdżystego – w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości | 1–10  |
| b) złamanie z kompresją trzonu powyżej 25%, inne złamanie kręgu powodujące zniekształcenie dużego stopnia, zwichnięcie, usztywnienie operacyjne – w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości                                          | 10–20 |
| c) całkowite zeszczywnienie – w zależności od ustawienia kręgosłupa                                                                                                                                                                      | 20–30 |

**UWAGA:**

Złamanie więcej niż jednego kręgu lub usunięcie więcej niż jednego jądra miażdżystego – oceniać według punktu 90 b lub c w zależności od stopnia zniekształcenia i zaburzenia ruchomości.

**91. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym (Th12–L5):**

|                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) skręcenie, stłuczenie, z niewielkim uszkodzeniem aparatu więzadłowego – w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości                                                                                                                 | 1–5   |
| b) złamanie blaszki granicznej lub kompresja trzonu kręgu do 25% wysokości kręgu, inne złamanie kręgu powodujące zniekształcenie średniego stopnia, stan po usunięciu jądra miażdżystego – w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości | 5–15  |
| c) złamanie z kompresją trzonu powyżej 25%, inne złamanie kręgu powodujące zniekształcenie dużego stopnia, zwichnięcie, usztywnienie operacyjne – w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości                                          | 15–30 |
| d) zeszczywnienie – w zależności od ustawienia kręgosłupa                                                                                                                                                                                | 30–40 |

**UWAGA:**

Jeżeli złamaniu Th12 towarzyszy złamanie sąsiedniego kręgu w odcinku piersiowym, oceniać według punktu 91 tabeli.

Złamanie więcej niż jednego kręgu lub usunięcie więcej niż jednego jądra miażdżystego oceniać według punktu 91 b lub c w zależności od stopnia zniekształcenia i zaburzenia ruchomości.

Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa lędźwiowego jest zespół bólowy korzeniowy, oceniać wyłącznie według punktu 95.

Kręgoszyk rzekomy (zwyrodnieniowy) i prawdziwy (na tle kręgoszczeliny) nie jest traktowany jako następstwo nieszczęśliwego wypadku.

**92. Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych lub ościстых kręgu, kości guzicznej:**

|                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a) złamanie jednego wyrostka poprzecznego lub ościстого kręgu, złamanie kości guzicznej                                                              | 1–2  |
| b) mnogie złamanie wyrostków poprzecznych lub ościстых kręgów (w zależności od liczby, stopnia przemieszczenia i ograniczenia ruchomości kręgosłupa) | 2–10 |

**UWAGA:**

W przypadku istnienia zespołu bólowego guzicznego

w związku ze stłuczeniem lub złamaniem kości guzicznej oceniać wyłącznie wg punktu 95 h.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>93.</b> Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgow, obecnością ciała obcego (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych) itp. – ocenia się wg poz. 89–92, zwiększając stopień uszczerbku o:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5–10                          |
| <b>94.</b> Uszkodzenie rdzenia kręgowego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| a) porażenie kończyn górnych i/lub dolnych 0–1° w skali Lovette'a, głęboki niedowład czterokończynowy 2° w skali Lovette'a, zespół Brown-Sequarda, będący następstwem połowicznego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z porażeniem kończyn 0–1° w skali Lovette'a                                                                                                                                                                                                                                       | 100                           |
| b) głęboki niedowład kończyn górnych lub dolnych – 2° w skali Lovette'a, niedowład czterokończynowy 3° w skali Lovette'a, zespół Brown-Sequarda, będący następstwem połowicznego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn 2° w skali Lovette'a                                                                                                                                                                                                                                          | 60–80                         |
| c) średniego stopnia niedowład kończyn górnych lub dolnych – 3° w skali Lovette'a, zespół Brown-Sequarda, będący następstwem połowicznego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn 3° w skali Lovette'a, lub połowiczne uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym – z niedowładem kończyny dolnej 0–2° w skali Lovette'a                                                                                                                                                                 | 30–60                         |
| d) niewielki niedowład kończyn górnych i/lub dolnych – 4° w skali Lovette'a z zaburzeniami ze strony zwieraczy i zaburzeniami ze strony narządów płciowych, zespół Brown-Sequarda, będący następstwem połowicznego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn 4° w skali Lovette'a lub połowiczne uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym – z niedowładem kończyny dolnej 3–4° w skali Lovette'a, izolowane zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych, zespół stożka końcowego | 5–40                          |
| e) niewielki niedowład kończyn górnych i/lub dolnych – 4° w skali Lovette'a bez zaburzeń ze strony zwieraczy i narządów płciowych, zaburzeń troficznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5–30                          |
| <b>UWAGA:</b><br>Ocena porażań zwieraczy i zaburzeń ze strony narządów płciowych wchodzi w zakres oceny punktu 94 a–c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>95.</b> Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowy, czuciowy lub mieszane) – w zależności od stopnia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| a) szyjne bólowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2–5                           |
| b) szyjne bez niedowładów – ból, zaburzenia czucia, osłabienie lub brak odruchów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5–15                          |
| c) szyjne z obecnością niedowładów – w zależności od stopnia niedowładu i zaników mięśniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10–30                         |
| d) piersiowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2–10                          |
| e) lędźwiowo-krzyżowe bólowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2–5                           |
| f) lędźwiowo-krzyżowe bez niedowładów – ból, zaburzenia czucia, osłabienie lub brak odruchów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5–15                          |
| g) lędźwiowo-krzyżowe z obecnością niedowładów – w zależności od stopnia niedowładu i zaników mięśniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10–30                         |
| h) guziczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2–5                           |
| <b>UWAGA:</b><br>Zaburzenia stwierdzone w punktach 95 a–h powinny mieć potwierdzenie w obiektywnej dokumentacji medycznej z leczenia i diagnostyki następstw zdarzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |

## J. USZKODZENIA MIEDNICY

|                                                                                                                                                | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>96.</b> Rozejście spojenia łonowego i/lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego – w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu: |                               |

|                                                                                                                                                | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) rozejście spojenia łonowego, bez dolegliwości ze strony stawów krzyżowo-biodrowych, bez zaburzeń chodu                                      | 1–5                           |
| b) rozejście spojenia łonowego z dolegliwościami ze strony stawów krzyżowo-biodrowych, z zaburzeniami chodu                                    | 5–15                          |
| c) rozejście, zwłknięcie spojenia łonowego ze zwłknięciem stawu krzyżowo-biodrowego leczone operacyjnie w zależności od stopnia zaburzeń chodu | 15–35                         |

**UWAGA:**

Jeżeli rozejściu spojenia łonowego towarzyszy złamanie kości miednicy, oceniać według punktu 97 lub 99.

**97. Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy kończyny dolnej jedno- lub wielomiejscowe – w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu:**

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) w odcinku przednim jednostronne (kość łonowa, kość łonowa i kulszowa) | 1–20  |
| b) w odcinku przednim obustronnie                                        | 5–25  |
| c) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaignea)                          | 15–40 |
| d) w odcinku przednim i tylnym obustronnie                               | 40–45 |

**UWAGA:**

Złamania stabilne kości miednicy, złamania awulsyjne oceniać według punktu 99.

**98. Złamanie panewki stawu biodrowego z centralnym lub bez centralnego zwłknięcia stawu – w zależności od upośledzenia funkcji stawu:**

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) złamanie niewielkiego fragmentu panewki bez zwłknięcia centralnego lub z centralnym zwłknięciem I°  | 1–10  |
| b) pozostałe zwłknięcia centralne i złamania panewki – ze średnim stopniem ograniczenia funkcji        | 10–25 |
| c) pozostałe zwłknięcia centralne i złamania panewki – ze znacznym stopniem ograniczenia funkcji stawu | 25–40 |
| d) bardzo duże zmiany, zeszczywnienie w stawie – w zależności od ustawienia                            | 40–60 |

**UWAGA:**

Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem oceniać wg punktu 143.

**99. Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej:**

|                                                                                                                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a) jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej – bez zniekształcenia i bez zaburzenia funkcji | 1–5  |
| b) mnogie złamania kości miednicy i/lub kości krzyżowej – bez zniekształcenia i bez zaburzenia funkcji                                                             | 2–7  |
| c) jednomiejscowe złamanie kości miednicy i/lub kości krzyżowej – ze zniekształceniem i z zaburzeniami funkcji                                                     | 3–10 |
| d) mnogie złamania kości miednicy i/lub kości krzyżowej ze zniekształceniem i z zaburzeniami funkcji                                                               | 5–20 |

**UWAGA:**

Towarzyszące złamaniom uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo wg pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.

## K. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

| Obręcz kończyny górnej        | Procent uszczerbku na zdrowiu |      |
|-------------------------------|-------------------------------|------|
|                               | Prawa                         | Lewa |
| <b>100. Złamanie łopatki:</b> |                               |      |



| Obręcz kończyny górnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Procent uszczerbku na zdrowiu |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prawa                         | Lewa  |
| a) wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem bez większych zaburzeń funkcji kończyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1–10                          | 1–5   |
| b) wygojone złamanie łopatki z dużym przemieszczeniem i wyraźnym upośledzeniem funkcji kończyny – w zależności od stopnia zaburzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10–30                         | 5–25  |
| c) wygojone złamanie szyjki i panewki z dużym przemieszczeniem, przykurczem w stawie łopatkowo-ramiennym, z dużymi zanikami mięśni i innymi zmianami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30–55                         | 25–45 |
| <b>UWAGA:</b><br>Normy pozycji 100 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |       |
| <b>101.</b> Stan po złamaniu obojczyka – w zależności od stopnia zniekształcenia i/lub ograniczenia ruchów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |       |
| a) niewielkie zniekształcenie, bez ograniczenia ruchów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1–3                           | 1–2   |
| b) średniego stopnia zniekształcenie i ograniczenie ruchu miernego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3–10                          | 2–5   |
| c) duże zniekształcenie i ograniczenie ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10–25                         | 5–20  |
| <b>102.</b> Staw rzekomy obojczyka – w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10–25                         | 5–20  |
| <b>UWAGA:</b><br>W przypadku złamania obojczyka powikłanego stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |       |
| <b>103.</b> Podwichnięcie, zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego – w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |       |
| a) nieznaczne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1–5                           | 1–3   |
| b) zmiany średniego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5–15                          | 3–12  |
| c) znaczne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15–25                         | 12–20 |
| <b>UWAGA:</b><br>W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny górnej wynika z nakładania się skutków złamania obojczyka oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie według pozycji 182, natomiast stopień zniekształcenia obojczyka według pozycji 101–103. W przypadku nienakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pozycji 182.                                                                                                       |                               |       |
| <b>104.</b> Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych) – ocenia się wg poz. 101–103 – zwiększając stopień trwałego uszczerbku o:                                                                                                                                                                                                                      |                               | 1–5   |
| <b>105.</b> Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego (zwichnięcia, złamania głowy, nasady bliższej kości ramiennej, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku – w zależności od blizn, ubytków tkanek, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i zniekształceń:                                                                                                                                                                                     |                               |       |
| a) miernego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1–10                          | 1–5   |
| b) średniego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10–20                         | 5–15  |
| c) dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20–30                         | 15–25 |
| <b>106.</b> Zestarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu łopatkowo-ramiennego w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20–35                         | 15–30 |
| <b>107.</b> Nawykowe zwichnięcie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |       |
| a) po leczeniu operacyjnym w zależności od ograniczenia ruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5–25                          | 5–20  |
| b) nieleczone operacyjnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                            | 20    |
| <b>UWAGA:</b><br>Nawykowego zwichnięcia nie należy traktować jako kolejnego nieszczęśliwego wypadku, lecz jako skutek ostatniego urazowego zwichnięcia stawu łopatkowo-ramiennego. Przy orzekaniu według punktu 107 należy zebrać szczegółowy wywiad w kierunku przebytych wcześniej urazowych zwichnięć w stawie oraz zapoznać się z dodatkową dokumentacją medyczną w celu ustalenia daty ostatniego zwichnięcia urazowego oraz daty pierwszego zwichnięcia nawykowego. |                               |       |

| Obręcz kończyny górnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Procent uszczerbku na zdrowiu |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prawa                         | Lewa  |
| <b>108.</b> Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości – w zależności od zaburzeń funkcji:                                                                                                                                                                                                                                   | 25–40                         | 20–35 |
| <b>UWAGA:</b><br>Staw wiotki z powodu porażenia ocenia się wg norm neurologicznych.                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |       |
| <b>109.</b> Zesztywnienie stawu barkowego:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |       |
| a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności od ustawienia i funkcji                                                                                                                                                                                                                                                        | 20–35                         | 15–30 |
| b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                            | 35    |
| <b>110.</b> Bliznowaty przykurcz stawu barkowego – w zależności od zaburzeń czynności stawu: orzekać według punktu 105 lub 109.                                                                                                                                                                                                       |                               |       |
| <b>111.</b> Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), przetokami i zmianami neurologicznymi – ocenia się wg poz. 105–110, zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji: | 1–35                          | 1–25  |
| <b>112.</b> Utrata kończyny w barku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75                            | 70    |
| <b>113.</b> Utrata kończyny wraz z łopatką:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80                            | 75    |

| Ramię                                                                                                                                                                 | Procent uszczerbku na zdrowiu |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                       | Prawe                         | Lewe  |
| <b>114.</b> Złamanie trzonu kości ramiennej – w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym oraz zaburzeń neurologicznych: |                               |       |
| a) zmiany niewielkiego stopnia                                                                                                                                        | 3–15                          | 2–10  |
| b) zmiany średniego stopnia                                                                                                                                           | 15–30                         | 10–25 |
| c) zmiany dużego stopnia, przewlekłe zapalenie kości, przetoki, brak zrostu, staw rzepekomy                                                                           | 30–55                         | 25–50 |
| <b>115.</b> Uszkodzenia skóry, ubytki mięśni, uszkodzenia ścięgien, naczyń, nerwów ramienia – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:                  |                               |       |
| a) zmiany niewielkie                                                                                                                                                  | 1–5                           | 1–5   |
| b) zmiany średnie                                                                                                                                                     | 5–10                          | 5–10  |
| c) zmiany duże                                                                                                                                                        | 10–50                         | 10–45 |
| <b>UWAGA:</b><br>Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktu 114.                  |                               |       |
| <b>116.</b> Utrata kończyny w obrębie ramienia:                                                                                                                       |                               |       |
| a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej                                                                                                                   | 70                            | 65    |
| b) przy dłuższych kikutach                                                                                                                                            | 65                            | 60    |
| <b>117.</b> Przepukliny mięśniowe ramienia – w zależności od rozmiarów:                                                                                               | 1–8                           | 1–6   |

| Łokieć                                                                                                                                                                                                                        | Procent uszczerbku na zdrowiu |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                               | Prawy                         | Lewy |
| <b>118.</b> Złamania w obrębie łokcia (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) – w zależności od zniekształceń i ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz deficytów neurologicznych: |                               |      |
| a) niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                          | 1–5                           | 1–4  |

| Łokieć                                                                          | Procent uszczerbku na zdrowiu |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                 | Prawy                         | Lewy  |
| b) średnie zmiany                                                               | 5–15                          | 4–10  |
| c) duże zmiany, przewlekłe zapalenie kości, przetoki, brak zrostu, staw rzekomy | 15–50                         | 10–45 |

**119. Zesztywnienie stawu łokciowego:**

|                                                                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (70°–105°) | 30    | 25    |
| b) z brakiem ruchów obrotowych                                                                      | 35    | 30    |
| c) w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (0°–20°)                                                   | 50    | 45    |
| d) w innych ustawieniach – w zależności od przydatności czynnościowej kończyny                      | 30–45 | 25–40 |

**120. Uszkodzenia łokcia — zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich, skóry oraz zaburzenia neurologiczne — w zależności od blizn, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń, deficytów neurologicznych:**

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| a) zmiany niewielkiego stopnia     | 1–5   | 1–4   |
| b) zmiany średniego stopnia        | 5–15  | 4–10  |
| c) zmiany dużego stopnia, przetoki | 15–45 | 10–40 |

**UWAGA:**

Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktu 118.

|                                                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>121. Cepowy staw łokciowy – w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni:</b> | 15–30 | 10–25 |
| <b>122. Utrata kończyny górnej na poziomie stawu łokciowego:</b>                     | 65    | 60    |

**UWAGA:**

Funkcjonalny pełny wyprost stawu łokciowego 0°, pełne zgięcie 140°, supinacja i pronacja 0°–80°.

| Przedramię | Procent uszczerbku na zdrowiu |      |
|------------|-------------------------------|------|
|            | Prawe                         | Lewe |

**123. Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka, ruchów obrotowych przedramienia, ruchomości palców i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych:**

|                                                                                                                                                                                        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a) bez lub z niewielkim zniekształceniem bez istotnych zaburzeń ruchomości (np. złamania podokostnowe u dzieci, złamania bez przemieszczenia, izolowane złamania wyrostka rylcowatego) | 1–3   | 1–2   |
| b) średnie zniekształcenia z ograniczeniem ruchomości bez zaburzeń wtórnych                                                                                                            | 3–10  | 2–8   |
| c) średnie lub duże zniekształcenia ze średnim ograniczeniem ruchomości, ze zmianami wtórnymi (np. zespół Sudecka i inne)                                                              | 10–20 | 8–15  |
| d) bardzo duże zniekształcenia z dużym ograniczeniem ruchów, ze zmianami wtórnymi (np. zespół Sudecka i inne)                                                                          | 20–30 | 15–25 |

**124. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych:**

|                                      |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|
| a) niewielkie zmiany                 | 1–5   | 1–4   |
| b) średnie zmiany                    | 5–20  | 4–15  |
| c) duże zmiany, zmiany wtórne i inne | 20–35 | 15–30 |

**125. Uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń – w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne):**

|                      |      |     |
|----------------------|------|-----|
| a) niewielkie zmiany | 1–5  | 1–4 |
| b) średnie zmiany    | 5–10 | 4–8 |

| Przedramię        | Procent uszczerbku na zdrowiu |      |
|-------------------|-------------------------------|------|
|                   | Prawe                         | Lewe |
| c) znaczne zmiany | 10–20                         | 8–15 |

UWAGA:

Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktów 123, 124, 126, 127.

**126.** Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej – w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| a) średniego stopnia | 10–20 | 10–15 |
| b) dużego stopnia    | 20–35 | 15–30 |

UWAGA:

W przypadku złamania jednej kości przedramienia powikłanej stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 126.

**127.** Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia – w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| a) średniego stopnia | 10–25 | 10–20 |
| b) dużego stopnia    | 25–40 | 20–35 |

UWAGA:

W przypadku złamania obu kości przedramienia powikłanych stawem rzekomym orzekać wyłącznie z punktu 127.

**128.** Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi – ocenia się wg poz. 123–127, zwiększając stopień trwałego uszczerbku w zależności od stopnia powikłań:

|                                                                                                                               |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                               | 1–15  | 1–15  |
| <b>129.</b> Utrata kończyny w obrębie przedramienia – w zależności od charakteru kikutu i jego przydatności do oprotezowania: | 55–65 | 50–60 |
| <b>130.</b> Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka:                                                                        | 55    | 50    |

| Nadgarstek | Procent uszczerbku na zdrowiu |      |
|------------|-------------------------------|------|
|            | Prawy                         | Lewy |

**131.** Skręcenie, zwłknięcie w obrębie nadgarstka, złamanie kości nadgarstka (np. kości łódeczko-watej), uszkodzenia skóry, mięśni, naczyń – w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, rozległości uszkodzenia, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych:

|                                                                 |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a) niewielkiego stopnia                                         | 1–10  | 1–8   |
| b) średniego stopnia                                            | 10–20 | 8–15  |
| c) dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym | 20–30 | 15–25 |

**132.** Całkowite zeszytywnienie w obrębie nadgarstka (stawu promieniowo-nadgarstkowego):

|                                                                                                         |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców    | 15–30 | 10–25 |
| b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców | 25–45 | 20–40 |

**133.** Uszkodzenie nadgarstka powikłane głębokimi trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi – ocenia się wg poz. 131–132, zwiększając stopień trwałego uszczerbku – w zależności od stopnia powikłań:

|                                                 |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|
|                                                 | 1–10 | 1–10 |
| <b>134.</b> Utrata ręki na poziomie nadgarstka: | 55   | 50   |

| Śródreżce                                                                                                                                                                                                                               | Procent uszczerbku na zdrowiu |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                         | Prawy                         | Lewy |
| <b>135.</b> Złamania kości śródreżca, uszkodzenia ścięgien i pozostałych części miękkich (skóry, mięśni, naczyń, nerwów), w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, upośledzenia funkcji ręki i palców oraz innych zmian wtórnych: |                               |      |
| a) niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                    | 1-5                           | 1-4  |
| b) średnie zmiany                                                                                                                                                                                                                       | 5-10                          | 4-8  |
| c) rozległe zmiany                                                                                                                                                                                                                      | 10-20                         | 8-18 |

| Kciuk                                                                                                                                                                                                                                           | Procent uszczerbku na zdrowiu |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Prawy                         | Lewy  |
| <b>136.</b> Utrata w zakresie kciuka – w zależności od rozmiaru ubytku, blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:                                                     |                               |       |
| a) częściowa lub całkowita utrata opuszki, trwała utrata płytki paznokciowej                                                                                                                                                                    | 1-5                           | 1-4   |
| b) częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego                                                                                                                                                                                        | 5-15                          | 4-13  |
| c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawowego mniej niż 2/3 długości paliczka                                                                                                                                                | 15-20                         | 13-18 |
| d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego ponad 2/3 jego długości lub utrata obu paliczków bez kości śródreżca                                                                                                                   | 20-28                         | 18-25 |
| e) utrata obu paliczków z kością śródreżca                                                                                                                                                                                                      | 28-35                         | 25-33 |
| <b>137.</b> Inne uszkodzenia kciuka: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów – w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: |                               |       |
| a) niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                            | 1-5                           | 1-4   |
| b) średnie zmiany                                                                                                                                                                                                                               | 5-15                          | 4-13  |
| c) znaczne zmiany                                                                                                                                                                                                                               | 15-20                         | 13-18 |
| d) bardzo duże zmiany graniczące z utratą kciuka (dotyczy utraty funkcji)                                                                                                                                                                       | 20-23                         | 18-20 |
| e) całkowita bezużyteczność kciuka                                                                                                                                                                                                              | 25                            | 23    |
| f) rozległe zmiany, graniczące z utratą pierwszej kości śródreżca (dotyczy utraty funkcji)                                                                                                                                                      | 25-35                         | 23-33 |

UWAGA:

Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu.

| Palec wskazujący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procent uszczerbku na zdrowiu |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prawy                         | Lewy  |
| <b>138.</b> Utrata w obrębie wskaziciela – w zależności od blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki:                                                                                                                                                                                           |                               |       |
| a) utrata częściowa lub całkowita opuszki, trwała utrata płytki paznokciowej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-5                           | 1-4   |
| b) częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5-10                          | 4-8   |
| c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka środkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10-15                         | 8-13  |
| d) utrata dwóch paliczków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15-20                         | 13-18 |
| e) utrata w obrębie paliczka podstawowego lub utrata trzech paliczków                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20-25                         | 18-23 |
| f) utrata wskaziciela w obrębie lub z kością śródreżca                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25-30                         | 23-27 |
| <b>139.</b> Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów – w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszltywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych – w zależności od stopnia: |                               |       |

| Palec wskazujący                                                                    | Procent uszczerbku na zdrowiu |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                     | Prawy                         | Lewy  |
| a) niewielkie zmiany                                                                | 1–5                           | 1–4   |
| b) zmiany średniego stopnia                                                         | 5–10                          | 4–8   |
| c) zmiany dużego stopnia                                                            | 10–15                         | 8–13  |
| d) zmiany znacznego stopnia, graniczące z utratą wskaziciela (bezużyteczność palca) | 15–20                         | 13–18 |
| e) całkowita bezużyteczność wskaziciela                                             | 23                            | 20    |

| Palec trzeci, czwarty i piąty                                                    | Procent uszczerbku na zdrowiu |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                  | Prawa                         | Lewa  |
| <b>140.</b> Palec trzeci, czwarty i piąty – w zależności od stopnia uszkodzenia: |                               |       |
| a) częściowa lub całkowita utrata opuszki lub trwała utrata płytki paznokciowej  | 1–2,5                         | 1–2   |
| b) częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego                         | 2,5–5                         | 2–4,5 |
| c) utrata w obrębie paliczka środkowego lub utrata dwóch paliczków               | 5–8                           | 4,5–7 |
| d) utrata w obrębie paliczka podstawowego lub utrata trzech paliczków            | 8–10                          | 7–8,5 |
| <b>141.</b> Utrata palców III, IV lub V w obrębie lub z kością śródręcza:        | 10–15                         | 8–13  |

**UWAGA:**

Uszkodzenie palca III przy braku lub bezużyteczności wskaziciela ocenia się podwójnie palec trzeci. Palec trzeci może zastąpić wskaziciela, przy jego uszkodzeniu powstaje znaczne upośledzenie funkcji ręki.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>142.</b> Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów – w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszytwnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych – za każdy palec w zależności od stopnia: |       |       |
| a) niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1–2,5 | 1–2   |
| b) zmiany średniego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5–5 | 2–4,5 |
| c) zmiany dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5–8   | 4,5–7 |
| d) całkowita bezużyteczność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     | 8     |

**UWAGA:**

Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców, suma procentów za poszczególne uszkodzenia palców nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę ręki (dla prawej – 55%, dla lewej – 50%).

## L. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ

| Staw biodrowy                                                                                                                                                                                                                                                          | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>143.</b> Uszkodzenia stawu biodrowego – zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej – w zależności od zakresu ruchów, przemieszczeń, skrócenia, zniekształceń, zmian wtórnych: |                               |
| a) ze zmianami miernego stopnia                                                                                                                                                                                                                                        | 5–10                          |
| b) ze zmianami średniego stopnia                                                                                                                                                                                                                                       | 10–20                         |
| c) dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                      | 20–40                         |
| d) z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano, niepowodzenia leczenia operacyjnego – np. biodro wiszące itp.)                                                                                        | 40–65                         |
| e) leczenie uszkodzenia zakończone zabiegiem protezowania stawu w zależności od ograniczenia funkcji                                                                                                                                                                   | 15–40                         |
| <b>144.</b> Uszkodzenie tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego (skóry, mięśni, naczyń, aparatu więzadłowo-torebkowego, nerwów) – w zależności od blizn, ubytków, deficytów neurologicznych, stopnia ograniczenia ruchów:                                             |                               |

| Staw biodrowy           | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-------------------------|-------------------------------|
| a) niewielkiego stopnia | 1–5                           |
| b) średniego stopnia    | 5–15                          |
| c) znacznego stopnia    | 15–30                         |
| d) bardzo duże zmiany   | 30–60                         |

**UWAGA:**

Według tej pozycji oceniać uszkodzenia bez złamań kości i zwłknięć. W przypadku współistnienia złamań kości lub zwłknięć kości oceniać według punktu 143. W przypadku współistnienia uszkodzenia nerwów obwodowych w okolicy stawu biodrowego oceniać według punktu 144, w zależności od stopnia zaburzeń wykorzystując zakresy procentowe z punktu 182, odpowiadające poszczególnym nerwom (np. w przypadku współistnienia uszkodzenia nerwu kulszowego – zakres 20–60% w punkcie 182 – ocena winna być dokonana z punktu 144 c lub d.

**145. Zesztywnienie stawu biodrowego – w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15–35 |
| b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35–60 |
| <b>146. Uszkodzenia w obrębie i okolicy stawu biodrowego powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi – ocenia się wg poz. 143 i 145, zwiększając stopień trwałego uszczerbku w zależności od stopnia powikłań:</b> | 5–15  |
| <b>147. Utrata kończyny dolnej przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy pod-krętarzowej – w zależności od zniekształceń, stanu kikutu i możliwości jego oprotegowania:</b>                                                                                                                                                                               | 75–85 |

| Udo | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|-------------------------------|
|-----|-------------------------------|

**148. Złamanie kości udowej – w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń chodu, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych:**

|                                                                                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) niewielkie zmiany – wzrost niepowikłany, bez zaburzeń osi kończyny                                                                                                          | 1–15  |
| b) średnie zmiany – wzrost złamania, zaburzenia osi kończyny, skrócenie kończyny od 3 do 6 cm, zaburzenia rotacji kończyny w średnim stopniu upośledzające chód                | 15–30 |
| c) duże zmiany – wzrost opóźniony, znaczne zaburzenia osi kończyny, skrócenie kończyny powyżej 6 cm, zaburzenia rotacji kończyny w znacznym stopniu upośledzające chód         | 30–40 |
| <b>149. Staw rzekomy kości udowej, ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążenie kończyny – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych:</b> | 40–60 |

**150. Uszkodzenie skóry, mięśni, ścięgien (blizny, ubytki, przepukliny mięśniowe itp.) – w zależności od zaburzeń funkcji itp.:**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| a) niewielkiego stopnia | 1–5   |
| b) średniego stopnia    | 5–10  |
| c) znacznego stopnia    | 10–20 |

**UWAGA:**

Według tej pozycji oceniać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości oceniać według punktu 148.

**151. Uszkodzenie dużych naczyń, tętniaki pourazowe – w zależności od stopnia zaburzeń:**

5–30

**152. Uszkodzenie uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, ciałami obcymi (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), skostnieniem pozazachyłowym i zmianami neurologicznymi (z wyłączeniem nerwu kulszowego) – ocenia się wg punktu 148–151, zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od rozmiarów powikłań o:**

1–20

**153. Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg punktu 148–151, zwiększając stopień trwałego uszczerbku – w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o:**

10–65

| Udo | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|-------------------------------|
|-----|-------------------------------|

UWAGA:

Łączny stopień uszczerbku ocenianego wg poz. 148–151 i poz. 153 nie może przekroczyć 70%.

|                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>154.</b> Utrata kończyny – w zależności od długości kikuta i przydatności jego cech do oprotezowania: | 50–70 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| Kolano | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|--------|-------------------------------|
|--------|-------------------------------|

**155.** Złamanie nasad tworzących staw kolanowy i rzepki z lub bez uszkodzenia aparatu więzadłowego – w zależności od zniekształceń, szpotawości, koślawości, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu, zaburzeń statyczno-dynamicznych kończyny i innych zmian:

|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) niewielkie zmiany — możliwość zgięcia do kąta w przedziale 90°–120° i/lub deficyt wyprostu do kąta 5°, mała lub średnia niestabilność prosta lub niewielka rotacyjna                                                                                       | 1–10  |
| b) średnie zmiany – możliwość zgięcia do kąta w przedziale od 40° do 90° i/lub deficyt wyprostu do kąta w zakresie 15°–5°, duża niestabilność prosta lub średniego stopnia rotacyjna bądź niewielkiego lub średniego stopnia złożona, zaburzenia osi kończyny | 10–25 |
| c) duże zmiany – możliwość zgięcia do kąta w przedziale od 0°–40° i/lub deficyt wyprostu do kąta powyżej 15°, utrwalone duże niestabilności złożone i rotacyjne, znaczne zaburzenia osi kończyny                                                              | 25–40 |
| d) zeszytnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnej korzystnej 0–15°                                                                                                                                                                                     | 30    |
| e) zeszytnienie stawu kolanowego w pozycjach funkcjonalnych niekorzystnych                                                                                                                                                                                    | 30–40 |

**156.** Skręcenia i zwicnięcia stawu kolanowego (w tym zwicnięcie rzepki) z uszkodzeniem aparatu więzadłowo-stawowego (torebki, więzadeł, łątek) – w zależności od ograniczenia ruchów, stabilności stawu, wydolności statyczno-dynamicznej kończyny:

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) izolowane uszkodzenia łątek, stan po leczeniu operacyjnym łątek z dobrym efektem, uszkodzenia aparatu więzadłowego bez cech niestabilności – w zależności od stopnia upośledzenia zakresu ruchu                                                                    | 1–5   |
| b) uszkodzenia aparatu więzadłowego z lub bez uszkodzenia łątek – powodujące małą lub średnią niestabilność prostą, niewielkiego stopnia rotacyjną, stan po leczeniu operacyjnym struktur stawu z dobrym efektem – w zależności od stopnia upośledzenia zakresu ruchu | 1–10  |
| c) uszkodzeniami aparatu więzadłowego z lub bez uszkodzenia łątek, powodujące dużą niestabilność prostą lub średniego stopnia rotacyjną, bądź niewielkiego lub średniego stopnia złożoną – w zależności od upośledzenia zakresu ruchu                                 | 10–25 |
| d) utrwalone duże niestabilności złożone i rotacyjne, uszkodzenia obu więzadeł krzyżowych, znaczne zaburzenia osi kończyny – w zależności od stopnia upośledzenia zakresu ruchu                                                                                       | 25–40 |

**157.** Inne uszkodzenia okolicy stawu kolanowego – blizny skóry, ciała obce (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), przewlekłe stany zapalne, przetoki i inne zmiany wtórne – w zależności od nasilenia zmian:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| a) niewielkie zmiany | 1–5   |
| b) średnie zmiany    | 5–10  |
| c) duże zmiany       | 10–20 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>158.</b> Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego: | 65 |
|-----------------------------------------------------------|----|

UWAGA:

Prawidłowo funkcjonalny zakres ruchów w stawie kolanowym przyjmuje się od 0° dla wyprostu do 120° dla zgięcia. Jeżeli zeszytnienie stawu kolanowego jest spowodowane uszkodzeniami innymi niż złamanie kości, oceniać według punktu 155 d lub e.

| Podudzie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

**159.** Złamanie trzonów kości podudzia jednej lub obu – w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.:



| Podudzie                                                                                                                                                                                                                                                   | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) niewielkie zmiany – wzrost niepowikłany, niewielkie zaburzenia osi kończyny, niewielkie skrócenie                                                                                                                                                       | 5–15                          |
| b) średnie zmiany – wzrost złamania lub cechy wzrostu opóźnionego, zaburzenia osi kończyny w średnim stopniu upośledzające chód                                                                                                                            | 15–30                         |
| c) bardzo rozległe zmiany kości z towarzyszącymi ograniczeniami funkcji sąsiednich stawów – powikłane przewlekłym zapaleniem kości z przetokami, ubytkami kości, stawem rzekomym, martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi i innymi zmianami wtórnymi | 30–50                         |
| <b>160.</b> Izolowane złamanie strzałki (nie obejmuje kostki bocznej) – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, upośledzenia funkcji kończyny:                                                                                                       | 1–5                           |

**UWAGA:**

W przypadku współistnienia trwałego uszkodzenia nerwu strzałowego, uszczerbek oceniać dodatkowo wg punktu 182 u.

**161.** Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, nerwów podudzia, ścięgna Achillesa i innych ścięgien – w zależności od rozległości uszkodzenia, zniekształcenia stopy i ograniczeń czynnościowych, zmian neurologicznych, naczyniowych, troficznych i innych:

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| a) niewielkie zmiany                                           | 1–5   |
| b) średnie zmiany                                              | 5–15  |
| c) znaczne zaburzenia funkcji stopy, duże zmiany neurologiczne | 15–35 |

**UWAGA:**

Według tej pozycji orzekać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości orzekać według punktu 159, 160.

**162.** Utrata kończyny w obrębie podudzia – w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do oprotezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny:

|                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) przy długości kikuta do 8 cm, mierząc od szpary stawowej (u dzieci do lat 10 przy długości kikuta do 6 cm) | 60    |
| b) przy dłuższych kikutach                                                                                    | 40–55 |

| Staw goleniowo-skokowy i skokowo-piętowy, stopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>163.</b> Uszkodzenie stawu goleniowo-skokowego i/lub skokowo-piętowego – skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia więzadeł, torebki, uszkodzenia tkanek miękkich, blizny – w zależności od zniekształceń, funkcji stopy, zmian wtórnych i innych powikłań:                                                                                                                   |                               |
| a) następstwa skręceń powodujące niewielkie zaburzenia ruchomości, niewielkie zniekształcenia, blizny, ubytki                                                                                                                                                                                                                                                             | 1–2                           |
| b) miernego stopnia zaburzenia ruchomości i zniekształcenie – po częściowym uszkodzeniu więzadeł bez niestabilności w stawach                                                                                                                                                                                                                                             | 2–5                           |
| c) średniego stopnia zaburzenia ruchomości i zniekształcenie – po częściowym uszkodzeniu więzadeł, z niestabilnością w stawach                                                                                                                                                                                                                                            | 5–10                          |
| d) duże zmiany z utrzymującymi się objawami funkcjonalnej niestabilności stawów, po całkowitym rozerwaniu więzadeł                                                                                                                                                                                                                                                        | 10–20                         |
| <b>164.</b> Złamania i zwichnięcia kości wchodzących w skład stawu goleniowo – skokowego i/lub skokowo- piętowego, nasad dalszych kości podudzia – w zależności od zniekształceń, ograniczeń ruchomości stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy, zeszczywnienia stawów goleniowo-skokowego i/lub skokowo-piętowego – w zależności od utrzymujących się dolegliwości: |                               |
| a) niewielkiego stopnia ograniczenie funkcji w obrębie stawów skokowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2–5                           |
| b) średniego stopnia zaburzenia funkcji w obrębie stawów skokowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5–10                          |
| c) dużego stopnia zaburzenia funkcji w obrębie stawów skokowych lub zeszczywnienie w ustawieniu pod kątem zbliżonym do prostego                                                                                                                                                                                                                                           | 10–20                         |

| Staw goleniowo-skokowy i skokowo-piętowy, stopa                                                                                                                                                                                                               | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| d) zeszywnienie w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym                                                                                                                                                                                                       | 20–30                         |
| e) znacznego stopnia zaburzenia funkcji w obrębie stawów skokowych, powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami, martwicą, zmianami troficznymi i innymi zmianami wtórnymi, zeszywnienie w ustawieniu niekorzystnym                            | 20–40                         |
| <b>UWAGA:</b><br>Jeżeli złamaniom lub zwichnięciom towarzyszą uszkodzenia więzadłowe, trwałe uszczerbek na zdrowiu należy oceniać z punktu 164.                                                                                                               |                               |
| <b>165.</b> Złamania kości skokowej i/lub piętowej (niewchodzące w zakres punktu 164) – w zależności od utrzymujących się dolegliwości, przemieszczeń, zniekształceń, ustawienia stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych, zmian troficznych i innych powikłań: |                               |
| a) niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                          | 1–10                          |
| b) średnie zmiany                                                                                                                                                                                                                                             | 10–20                         |
| c) duże zmiany                                                                                                                                                                                                                                                | 20–30                         |
| <b>166.</b> Utrata kości skokowej i/lub piętowej – w zależności od wielkości, blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy i innych powikłań:                                                                                                  |                               |
| a) częściowa utrata                                                                                                                                                                                                                                           | 20–30                         |
| b) całkowita utrata                                                                                                                                                                                                                                           | 30–40                         |
| <b>167.</b> Złamania i zwichnięcia kości stępu w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i innych zmian wtórnych:                                                                                                                                          |                               |
| a) niewielkiego stopnia – w zależności od wielkości zaburzeń czynnościowych                                                                                                                                                                                   | 1–5                           |
| b) średniego stopnia – w zależności od wielkości zaburzeń czynnościowych                                                                                                                                                                                      | 5–10                          |
| c) znacznego stopnia lub z innymi powikłaniami – w zależności od wielkości zaburzeń                                                                                                                                                                           | 10–20                         |
| <b>168.</b> Złamania kości śródstopia – w zależności od przemieszczeń, zniekształcenia stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych i innych zmian:                                                                                                                 |                               |
| a) złamanie jednej kości śródstopia – I lub V                                                                                                                                                                                                                 | 1–10                          |
| b) złamanie jednej kości śródstopia – II, III lub IV                                                                                                                                                                                                          | 1–5                           |
| c) złamanie dwóch kości śródstopia                                                                                                                                                                                                                            | 2–15                          |
| d) złamanie trzech lub więcej kości śródstopia                                                                                                                                                                                                                | 5–20                          |
| <b>169.</b> Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi – ocenia się wg poz. 168, zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od stopnia powikłań o:                         |                               |
| <b>170.</b> Inne uszkodzenia okolicy stępu i śródstopia – skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów – w zależności od rozmiaru blizn, zniekształceń, zmian troficznych, zaburzeń dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych: |                               |
| a) zmiany niewielkie                                                                                                                                                                                                                                          | 1–5                           |
| b) średnie zmiany                                                                                                                                                                                                                                             | 5–10                          |
| c) duże zmiany                                                                                                                                                                                                                                                | 10–15                         |
| <b>171.</b> Utrata stopy w całości:                                                                                                                                                                                                                           | 50                            |
| <b>172.</b> Utrata stopy na poziomie stawu Choparta:                                                                                                                                                                                                          | 45                            |
| <b>173.</b> Utrata stopy w stawie Lisfranka:                                                                                                                                                                                                                  | 35                            |
| <b>174.</b> Utrata stopy w obrębie kości śródstopia – w zależności od rozległości utraty przodostopia i cech kikuta:                                                                                                                                          | 20–30                         |

| Palce stopy                                                                                                                                                                                                                                              |  | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>175.</b> Utrata w zakresie palucha – w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, charakteru kikuta, zaburzeń statyki i chodu oraz innych zmian wtórnych:                                                                                 |  |                               |
| a) częściowa lub całkowita utrata opuszki lub trwała utrata płytki paznokciowej                                                                                                                                                                          |  | 1–3                           |
| b) częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego palucha                                                                                                                                                                                         |  | 3–8                           |
| c) utrata palucha na poziomie paliczka bliższego                                                                                                                                                                                                         |  | 8–14                          |
| d) całkowita utrata palucha                                                                                                                                                                                                                              |  | 15                            |
| <b>176.</b> Uszkodzenia palucha – zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich – w zależności od rozległości blizn, ubytków, zniekształcenia, upośledzenia funkcji stopy:                                                                          |  |                               |
| a) niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1–3                           |
| b) średnie zmiany                                                                                                                                                                                                                                        |  | 3–6                           |
| c) duże zmiany z niekorzystnym ustawieniem                                                                                                                                                                                                               |  | 6–10                          |
| <b>177.</b> Utrata palucha wraz z kością śródstopia – w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia:                                                                                                                                                  |  | 15–25                         |
| <b>178.</b> Utrata w zakresie palców II, III, IV i V:                                                                                                                                                                                                    |  |                               |
| a) częściowa utrata palca na wysokości paliczka środkowego – za każdy palec                                                                                                                                                                              |  | 1                             |
| b) całkowita utrata – za każdy palec                                                                                                                                                                                                                     |  | 2                             |
| <b>179.</b> Utrata palca V z kością śródstopia:                                                                                                                                                                                                          |  | 3–15                          |
| <b>180.</b> Utrata palców II, III i IV z kością śródstopia – w zależności od wielkości utraty kości śródstopia, ustawienia stopy i innych zmian wtórnych – za każdy palec:                                                                               |  | 3–5                           |
| <b>181.</b> Uszkodzenia II, III, IV i V palca – zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich – w zależności od rozległości blizn, ubytków, zniekształcenia, ustawienia, stopnia upośledzenia funkcji i liczby uszkodzonych palców orzekać łącznie: |  | 1–5                           |
| UWAGA:<br>Wartość uszczerbku ustalona za uszkodzenie jednego palca nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę tego palca.                                                                                                           |  |                               |

#### M. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH

|                                                                                                                                | Procent uszczerbku na zdrowiu |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
|                                                                                                                                | Prawa                         | Lewa |
| <b>182.</b> Uszkodzenie częściowe lub całkowite – w zależności od stopnia zaburzeń:                                            |                               |      |
| a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym                                                         |                               | 5–15 |
| b) nerwu piersiowego długiego                                                                                                  | 7–15                          | 5–10 |
| c) nerwu pachowego – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu                                                               | 3–25                          | 2–20 |
| d) nerwu mięśniowo-skórnego – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu                                                      | 3–25                          | 2–20 |
| e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójkątowego ramienia – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu | 3–45                          | 2–35 |
| f) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójkątowego ramienia – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu | 5–35                          | 3–25 |
| g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu   | 3–25                          | 2–20 |
| h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu      | 2–15                          | 1–10 |
| i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu                                        | 4–40                          | 3–30 |

|                                                                                           | Procent uszczerbku na zdrowiu |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                           | Prawa                         | Lewa  |
| j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu | 3–20                          | 2–15  |
| k) nerwu łokciowego – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu                         | 2–25                          | 1–20  |
| l) spletu barkowego części nadobojczykowej (górnej)                                       | 10–25                         | 5–20  |
| m) spletu barkowego części podobojczykowej (dolnej)                                       | 15–45                         | 10–40 |
| n) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego                                          |                               | 1–15  |
| o) nerwu zasłonowego – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu                        |                               | 2–20  |
| p) nerwu udowego – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu                            |                               | 2–30  |
| q) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego)                                                |                               | 3–20  |
| r) nerwu sromowego wspólnego                                                              |                               | 3–25  |
| s) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy                      |                               | 20–60 |
| t) nerwu piszczelowego – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu                      |                               | 5–40  |
| u) nerwu strzałkowego – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu                       |                               | 5–30  |
| v) spletu lędźwiowo-krzyżowego                                                            |                               | 30–70 |
| w) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego                                        |                               | 1–10  |

**UWAGA:**

Według punktu 182 ocenia się tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadku współistnienia uszkodzeń kostnych, mięśniowych i nerwowych, należy stosować ocenę wg punktów dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych.

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>183.</b> Kaulalgie potwierdzone obserwacją szpitalną – w zależności od stopnia: | 30-50 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**UWAGA:**

W ocenie tej zawiera się deficyt związany z uszkodzeniem typowym dla danego nerwu.

**UWAGI OGÓLNE:**

Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny górnej lub

dolnej (lub jej części) w ustaleniu ostatecznej wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu należy brać pod uwagę całkowitą funkcję kończyny (lub jej części), a nie tylko wynik matematyczny sumowania procentów trwałego uszczerbku za poszczególne uszkodzenia. Łączny uszczerbek na zdrowiu związany z uszkodzeniem skóry, mięśni, nerwów, kości nie może przekroczyć wartości za całkowitą utratę kończyny lub części kończyny, której te uszkodzenia dotyczą.

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany niepowikłanymi bliznami pooperacyjnymi, związanymi z leczeniem narządów i układów, zawiera się w punktach tabeli przewidzianych do oceny uszkodzenia tych narządów lub układów i nie podlega dodatkowemu orzekaniu.

W przypadku, gdy blizny są jedynym trwałym następstwem leczenia lub pojawiły się powikłania w postaci np. bliznowca lub przepukliny, oceniać według odpowiednich punktów tabeli przewidzianych dla uszkodzenia tkanek miękkich.

Uszkodzenie kikuta amputowanych kończyn, wymagające zmiany protezy, reamputacji lub niemożności zastosowania protezy oceniać wg amputacji na wyższym poziomie.

W przypadku uszkodzeń kończyn górnych u osób leworęcznych, stosować ocenę uszczerbku dla kończyny górnej lewej w wysokości uszczerbku, jaka jest przewidziana dla kończyny górnej prawej.